

H O R T I
M A L A B A R I C I
P A R S D U O D E C I M A , & U L T I M A ,
D E
H E R B I S
E T D I V E R S I S I L L A R U M
S P E C I E B U S

Latinis, Malabaricis, Arabicis, Brachmannum characteribus nominibusque expressis.

Adjecta Florum, Fructuum, Seminumque nativæ magnitudinis vera delineatione,
colorum viriumque accurata descriptione,

A D O R N A T A

Per piæ memoriæ Nobilissimum ac Geuerosissimum D. D.

HENRICUM VAN RHEDE TOT DRAKESTEIN,

Toparcham in Mydrecht, Malabarici Regni Gubernatorem, supremi Confessus apud
Indos Belgas Senatorem Extraordinarium, & Equestris Ordinis nomine Illustribus
ac Præpotentibus Provinciæ Ultrajectinæ Proceribus adscriptum.

In ordinem redegit & latinitate donavit,

A B R A H A M U S A P O O T M. D.

Notis ex parte adauxit, & Commentariis illustravit

J O A N N E S C O M M E L I N U S,

Reipublicæ Amstelodamensis (dum viveret) Senator, ac Horti Medici Præfessus.

Accedit, præter hujus partis specialem, generalis totius Operis Index.




A M S T E R D A M I.

Sumptibus Viduæ JOANNIS van SOMEREN, Hæredum JOANNIS van
DYCK, HENRICI & Viduæ THEODORI BOOM,

Anno clæ Icc ciii.

Anjeli Maravara. Lat.
20437 . Malabar.
Ponoffau-kely. Bram.



H O R T I
M A L A B A R I C I
P A R S D U O D E C I M A,
D E
H E R B I S
E T D I V E R S I S I L L A R U M
S P E C I E B U S.

A N G E L I M A R A V A R A.

T A B U L A I.

M*Aravara*, Bramannes dicunt *Ponossou-kely*, commune nomen est omnium plantarum, supra arbores crescentium, quæ in terra nec excoli, nec feri nec transplantari possunt; omne quod habent ex corticibus arborum extrahunt, quare etiam nomen *Maravaræ*, venenum arborum dicit. *Mara* enim arborem, *Vara* malum significat; omnes enim ejusmodi plantæ arbores quasi suffocant, ita ut brevi pereant. Nomen sortiuntur ab arboribus quibus insident; quare & hæc ab arbore *Angeli*, *Angeli Maravara* dicitur. Planta est altitudinis duorum cubitorum. *Radix* alba, lignosa, dura, inflexa, crispata, capillaribus, duris, teneris, pilosis radiculis, corticibus arborum sese affigentibus. Saporis aquei, odoris musci. *Caulis* è radice exfurgit, inter duas foliorum series, simplex, nitens, glaber, viridis, annulatus, intus carne viscida, glutinosa, filamentis lignosis in longitudinem pertexta, quæ quamquam lignosa, nunquam tamen ad duritiem ligni


accedunt, sed semper viscida medulla replentur. *Folia* quæ ex se invicem in vertice caulis proveniunt, & exsiccata ipsum caulem constituunt, oblongo angusta sunt, ab omni parte æque crassa & lata, complicata, glabra, viroris nitentis, sine venis & nervis conspicuis, duobus semicirculis ad se invicem excavata, densa, ita ut vix flecti possint, odoris & saporis expertia. Florum petioli, ex ipso caule inter folia, decem vel duodecim simul rectâ exsurgunt, virides sunt & rigidi, in longitudine firmioribus nervis instructi, intus carne & humore viscido repleti; ubi excrescunt magna copia minutissimarum gemmularum obducuntur, illæ albæ sunt, pedetentim sese ampliantes at non aperientes, antequam justam consecutæ sint magnitudinem. *Flores* omnes simul sese aperientes, caulem suis investiunt petalis, caudam vulpinam egregiè referentes, aspectu jucundi; petioli albicant, ad verticem caulis reflexi, cauli parvo, acuto foliolo annexi, primo virides exinde ruffi; ipsi flores *hexapeli* sunt, rigidi, crassi, oblongo rotundi, diffformes, candicantes, maculis rubris, cæruleis, luridis, aspersi sextum illorum lingulam habet inflexam, præ cæteris eminens, ex cæruleo-rubro optime refulgens, intus & extus pure candidum instar Lili, ex illo deorsum descendit capsula, instar crucibuli, interiori parte cava & alba, exteriori iisdem maculis, ut florum petala, aspersa. In medio florum circa finem petioli, elegans quasi avicula conspicitur, ex viridi nitens, maculis rubris cæruleisque variegata, crista candida in capite instructa; pes cui insistit colore intense purpureo se diffundit, usque in congeriem petalorum, ubi color tandem sub petalorum albedine disparet. Elegans rostellum aperturæ concavæ illius gemmulæ obvertitur, quasi semina ex illa appeteret. Brevi, elegantia & vera effigies, excellentissimæ hujus plantæ, verbis vix exprimi potest, omniumque spectatorum oculos trahit. Odoris in totum grati & amæni. *Fructus* ex petiolis florum proveniunt, oblongi, rotundi, circa pedem angusti, ad extremitates contracti, vertice tripartito, totidemque extuberantibus costis; viridinitentes sunt & glabri, exinde ruffi & subfusci, intra costas,

Itas, in latere plano, tres conspiciuntur futuræ, in quibus fructus seseaperiunt, & trifariam finduntur. *Cortex* crassus est, intus albus, lineis rubris notatus, illic loci ubi futuræ inter se invicem junguntur, lana candida mollissima fasciatim repletus, quæ fasciæ densissime sunt conjunctæ & quasi intricatæ, oris futurarum affixæ; lana ipsa exsiccata repleta est pulvere ruffo, subtili, instar pollinis, seminis vicem referentes; ipse fructus, petiolus, semen vix ullius sunt saporis vel odoris. Diu superstes est hæc planta, bis quotannis floret, in principio & fine temporis pluviosi, mensibus nempe Aprilis & Octobris. *Flores* per binos supersunt menses; ramus decius, in vitro vel vase aqua repleto impositus, non ante mensem exarescit. Ab incolis nulli adhibetur ornatui, neque in templis, pro monstro enim illam habent, ut quæ contra naturam à terra exulare videatur. Nota quod omnes hæ plantę *Maravara* in quatuor dispescantur ordines. Prior, qui hic exhibetur, simplici gaudet caule è radice exsurgente, atque eodem modo fructus & ramos floriferos edente. Alter ex communi radice diversos profert, ex quibus quedam plantæ non nisi flores & fructus, aliæ nil nisi folia gerunt. Tertius è radice fructum, è fructu folium, flores, & iterum alios producit fructus. Quartus, ita se arboribus inserit & commiscet ut non nisi magno labore ab illis possit dignosci, flores gerens & folia & fructus. Tota planta cum sero lactis & butyro concocta, vellicationes nervorum, spasmus, motus epilepticos infantum curat; in pulverem redacta & aque canne ex qua saccharum conficitur immixta, caput confortat, cerebrumque, vertiginem, febribus præcedentem, tollit: in cinerem combusta, & sale ex cinere extracto, palpitationem cordis sedat: majora folia cum illorum succo umbilico imposita, urinam, arenulas imo calculum & menses promovent. Radix trita cum melle recenti & bene cocto antiasthmaticum est imo antiphtysicum medicamentum: succus viscosus ex caulibus & foliis expressus temporibus & manuum arteriis impositus, febris sistit ardorem.

T A B. I.

Omnes hæ plantæ ordine sequentes sub cognomine *Maravara* descriptæ, ab Authore nostro pro specie *Visci* haberi videntur, quoniam ex sua sententia nunquam in terra progerminarent. Sed, cum pace magni illius viri dictum sit, meo judicio errat: in hisce enim regionibus multas videmus plantas arboribus vetustioribus insidentes, quæ

terræ mandatæ, sola cultura ad plantas possint referri terrestres; ut quam plurimæ species *Filicis Adianthi* &c. Unicum hoc tantum addam, nempe hanc *Angeli Maravaram* speciem esse *Orchidis abortiva*, vel *Orobanche*, ideoque à me vocatur *Orchis Abortiva Aizoides Malabariensis*, flore odoratissimo variegato, intus aviculam representante.



Biti maram Maravara. Lat.
202340. Mal.
Giriy. Bramin.



BITI MARAM MARAVARA.

TABULA II.



Lingua Bramannum. *Giriy*, priori speciei
 admodum similis est. *Radix* crassiola, fun-
 gosa, glabra, cineritia, intus viridis, car-
 nosa, viridi mucagine repleta, filamento
 ligneo suffulta, cui se arboribus vel illarum
 corticibus affigit. *Caulis* ex foliis conficitur,
 quibus à radice circumquaque concluduntur, deinde in
 duas se dividunt series, sed illa exsiccata & decidua caulem
 reliquunt nudum, qui viridis, vestigiis pedum foliorum
 in cortice geniculatim notatus, admodum tenuis est,
 nullo modo divellendus, in una parte viscidis & viridi albi-
 cantibus tubulis & medulla mucilaginosâ repletus. Sapo-
 ris & odoris expers. *Folia* cum illis *Angeli Maravaram* in
 omnibus conveniunt. *Flores* ejusdem sunt formæ, sed
 rubentes, cæruleis, flavis viridibusque maculis aspersi,
 avicula purpurea est. *Fructus*, qui ex petiolis florum con-
 ficitur, rotundus est & glaber, sine laciniis, in quo ab illo
 primæ speciei differt. *Succus* cum oleo Sergelim & recenti
 butyro concoctus febris ardorem restringit, stranguriæ
 medetur, calculos & menstrua provocat, hydropi adver-
 satur, tympanitidem discutit, morbum endemium curat,
 sanguinem melancholicum purgat. Sed ubi hæc planta
 supra arborem *Kansjiram* invenitur, tum vomitum ciet,
 totum corpus immodice turbat, alvum laxat & quidem
 tanta cum vehementia, ut non nisi summo cum periculo
 & præcautione adhiberi possit; nam illico sæpius hominem
 occidit. Nota quod hæc planta tum in totum, fellis instar,
 amara sit, & flores sine odore vel sapore; raro tamen in-
 venit, & quam minime in prædicta arbore.

TAB. 2.

Convenit hæc cum priori, mihi est *Orchis abortiva Aizoides Malabariensis altera, flore odorato, sanguineo*
colore, intus aviculam purpuream referente.

P: XII.

B

PON-

Ponnāmpu Maravāra Lat.

മലബാർ . Malab.

Suānna-puspā.

ബ്രഹ്മ . Brami.

عقربو . Arab.



PONNAMPOLU-MARVARA.

T A B U L A I I I.




Pertia species quam Bramannes *Souanna-Pouspa*, quasi diceret *flos aureus*, Belgice *Goud blom*; *Ponna* enim *aurum*, *Pou* flos est, vel *Robosa* vocant. *Radix* longa, rotunda, glabra, subviridis, fungosa, interiori parte viridis, humore viscido repleta, filamento cinereo pertexta, saporis & odoris aquei. *Caulis* ad duos exsurgit pedes viridi fuscus est, intus viscida, crassa, alba, limpida aqua & viridi medulla repletus, filamento carens, odoris & saporis expers. *Folia* cum præcedentibus pene conveniunt, viridia, glabra nitentia, rotundis oris, sine nervis, carne molli, viscida, mucaginosa repleta. *Florum* petioli proveniunt, octo vel decem simul, in altum sese erigentes, circa finem quam pluribus subflavis, & viridi intermixtis gemmulis, tribus eminentibus oris notati, & totidem lateribus planis; ubi cauli affiguntur, foliolo teguntur parvo concavo & viridi. *Flores* hextapetali sunt, crassi, oblongo-rotundi, flavi, interiori parte instar auri coruscantes; illis secundæ speciei admodum similes; *gemmula* in extremitate petioli oblonga est & alba, ad latera glabra, superiori parte quasi ore aperta, ex quo filamentum prodit rubrum, duobus flavis nodulis dotatum. Gratissimi sunt odoris, sed non tam diu supersunt ut illi *Angeli Maravara*. *Fructus* illis primæ speciei similes sunt, excepto quod horum vertex erecti, illorum magis dilatati sint; forma quasi sexagoni, quod in prioribus non item. *Folia* ab incolis coquuntur & multifariam comeduntur, sed non cum supra arborem *Tsjero* vel *Bibo* crescat planta. Bis quotannis floret. Tota planta trita, cocta & cum *Cootsj-Leetsji-Pulle* & oleo *Nucis Indicæ* usurpata lepram sanat; Pulvis cum flore *Oryzæ*, *Nuce Moschata*, *Naega-Pou* & melle

melle permixtus diarrhæam sistit; succus cum Nuce Moschata dysenteriam. Pulvis cum melle exhibitus furiosos sanat, bilem temperat. Flores in pulverem redacti, contra phtysin, asthma, maniam adhibentur.

T A B. 3.

Hæc mihi est *Orchis Anzides abortiva Malabariensis*, foliis obtusis, flore aureo odorato;



Thalia Maravira Lat.

842538. Malab.

Thali.

Brami.



THALIA MARAVARA.

TABULA IV.




Quarta species est, Bramannibus dicitur *Thali*. *Radices* longæ, corrugatæ, simplices, cinereæ, carneæ, filamento fortiter nervoso, humore viscido & carne subviridi repletæ; odorem referentes Musci viridis, saporem subsalsum. *Caulis* idem ut præcedentes sed magis corrugatus, viridis, vetustior cinereus; interiori parte filamentis lignosis repletus, quæ ruffa sunt & subviridia, mucagine obfusa. *Folia* cum prioribus conveniunt, sed densiora, & quasi coreacea, flectu fractuque difficilia; succus expressus & virgula aquantulum agitata saponis instar spumescit, unde & nomen *Thali* quod spumam significat, plantæ inditum est. Sapor subsalsus est, odor gramineus. *Florum* petiolus cum præcedentibus convenit, sed brevior est, in totum rigidus & lignosus, primo viridis, exinde ruffus, intus albus, humoris, odoris & saporis pene expers. *Flores* ut reliqui sed fasciatim provenientes, multo minores, flavi, rubeis radiis transversim quasi undulati, gratissimi odoris. *Fructus* ut illi *Biti-Maravari*, sed trigoni. Diu superstes est hæc planta, semper progerminans, floret mense Octobri, semel quotannis; ipsi flores à trunco avulsi longo tempore conservantur. *Radix* trita & in pulverem redacta, adhibetur in febribus ardentibus, morbillis, variolis; sudorem enim promovet. Succus Foliorum recens melle permixtus, alvum laxat.

Mau Tsierou maravira. Lat.

Ἰνδὸν
Ambo Kely bram.

جَهْرُ مَعْرُ وَالْمَحْ Arab.



TS FEROU. MAU. MARAVARA.

T A B U L A V.




Quinta species, lingua Bramannum *Ambo Keli*, prioribus multo minor; *Radices* longæ, rotundæ, fuscæ, duræ, tenues, lignosæ. In arbore *Mangus*, unde & nomen sortita est, quam maxime invenitur, odoris Musci; saporis subastringentis amari. *Caulis* arundinis instar erigitur, primo viridi clarus, exinde fuscus; viridi, aquea mucagine repletus, filamentis albis, lentis, nervosis pertexta; hæc a radice per caulem usque in folia divaricantur. *Folia* admodum angusta sunt, una parte concava, exteriori convexa, viridi clara, glabra, crassa, viridi & viscida carne repleta, sine sapore vel odore. Florum petioli intra folia proveniunt & caulem, decussatim dispositi, numero decem vel duodecim, teneres, rotundi, lignosi, virides, punctis rubris notati. *Flores* cum suis cauliculis, simul proveniunt, sine ordine viridi, trigono & superiori parte reflexo petiolo insidentes; illis *Thalia-Maravara* admodum similes; differunt tamen; hextapetali sunt, diffformes, quorum quinque flava, rubris quasi flammis circa oras notata; sextum candicat, ora rubent, sed tandem quasi flavescentia in albo disparent; in totum egregii sunt flores, aspectu jucundissimi, odore gratissimi. In medio rotundus, depressus, albus conspicitur globulus, elegantiori flavo penicillo ornatus. *Fructus* admodum exiguus est, oblongus, angustus, viridis, trigonus, inter angulos futura instructus. Tarde admodum provenit hæc planta, per multos annos superstes, floret mensibus Januarii & Februarii, sed non priusquam aliquot annorum ætatem fuerit consecuta, flores quatuor mensium spatio perdurant. Tota planta in formam cataplasomatis præparata abscessus sine dolore ad maturitatem perducit, in tempore adhibita affluxum humorum impedit. Pulvis cum aceto omnem renum pituitam expellit, ardorem in urinando & gonorrhæa restringit, ut & influxu albo mulierum; menses supra modum fluentes sistit.

Kolly Tserou mau Maravara. Lat.

മലബാർ Malab.

چھرو و مکر و تخم Arab.



K O L L I - T S F E R O U - M A U - M A R A V A R A .

T A B U L A V I .



Uasi diceres Belgice *Bladdrager*. Braman-
nibus *Ambo-tia* vocatur, masculus quasi
prioris plantæ, a qua non differt, nisi quod
nunquam floreat, & folia paulo longiora,
latiora & rigidiora sint; in medicina plane
nullum habens usum.

T A B. 4. 5. 6.

Hæ species plantæ sunt peculiares, quare ad species *Orchidis abortivæ* non facile possent referri,
nec etiam ad *Sedi* species pertinent; quapropter aliis istud iudicium relinquo.



Anantaly Maravara Lat.

മറവര. കളി Malab.

عناج كغلي Arab.



ANANTAL-MARAVARA

TABULA VII.



Rima planta secundi ordinis *Maravara*, etiam supra arbores crescens, sed tales quæ in arenoso inveniuntur solo, ad altitudinem trium quatuorve exurgens pedum. *Radices* habet quam plurimas, tenues, albas, curvas, duras, lignosas, quibus sese corticibus vetustiorum affigunt arborum, saporis & odoris expertes. *Caules* numero plures & quasi stolones è radice proveniunt, arundinacei, rotundi, virides, cochleatim intorti, geniculati, circulis flavis notati, duabus membranis obducti, quarum exterior nodos geniculorum obtegit, primò viridis, deinde cinereus: interior exteriori parte viridis est & nitens, interiori sanguineo rubra, filamentis albis pertexta. *Caulis* medulla viridi humoreque viscido repletus, filamentis tenuibus & robustioribus suffulto, coloris ruffi; simplex est è radice in rectum excrescens, semper foliis, vel floribus & fructibus instructus. *Folia* quæ suis pedibus instar tubuli concavi caulem investiunt & exornant, oblongo rotunda sunt, sine caulibus, antrosum & retrorsum in acutum desinentia, sed anteriori parte acutiora, oris glabra, secundum longitudinem costis instructa & striata, crassa, rigida, viridi clara, succo & medulla viscida repleta; Odore & sapore destituta. *Florum petiolus*, semper foliorum expers, etiam ex radice progerminat, ad altitudinem trium quatuorve pedum, ex quibus gemmæ, geniculi vel annuli & membranæ, proveniunt, aliquando duo simul, pluribus parvis gemmulis, rudimentum florum, obducti, qui totum caulem investiunt & eleganter exornant. *Flores* propriis suis petiolis striatis ex communi caule plurimi simul proveniunt, candicantes, hexapetali, tribus majoribus constantes foliolis & tribus angustioribus; lingula intus rubra est & crassifolia.

fiola. Gemmæ adhuc clausæ bifariam reflectuntur ab una parte corniculam, ab altera globulum referentes, aspectu jucundæ. Florum petala crassa sunt & rigida, grati & amœnissimi odoris. *Fructus* ex petiolis florum proveniunt, trilaterales, in lateribus planis futura instructi, ita ut quasi sexagoni videantur. Semine, colore, substantia destuuntur, illis primi ordinis in omnibus similes. Omnem hæc planta respuit culturam; diu superstes est; semel quotannis floret circa mensem Junium, flores quinque mensium spatio perdurant, quo tempore nec exarescunt nec decidunt. Florum caulis circa illud tempus avulsus & loco ficco suspensus, omnes suos profert flores & gemmas, quæ fructibus ad maturitatem perductis decidunt; ita ut nil nisi aëre, sine ulla alia materia, hæc planta ad progerminationem indigere videatur. Perennis est, per radices nempe, è quibus continuo novæ producuntur. Tota hæc planta recens usurpata, succus imprimis exhibitus, omnis generis ventris dolores & colicam sistit, bilem movet, alvum laxat.

T A B. 7.

Hæc mihi est *Orchis abortiva latifolia Malabarica*, *Clitoride*, flore luteo, piloso.



Kanspram Marabara. lat.

ꣳꣳ ꣳꣳꣳ Malab.

Sonou. bram.



KAN S FIRA M-MAR AVA RA.

T A B U L A V I I I.



Ramannibus dicitur *Sonou*; secunda species ordinis secundi; præsertim supra arborem *Kansjera Maram* crescit, in cujus fructibus rotundis, depressa illa, & in officinis notissima semina inveniuntur, *Nuces Vomicae* dicta, quod in descriptione istius arboris omisimus. *Radix* crassa, fungosa, crinita, carnea, nodosa, ruffa, muscosa, quæ se corticibus affigit & illis quasi adhæret, instar tuberis enim cum illo unitur. Saporis subamari, odoris aquei. *Folia* plura ex nodo radice proveniunt ad longitudinem duorum triumve pedum, latitudinem duorum digitorum, circa pedes angusta, ad extremitates latiora, obtusa, duabus suturis incisa, glabra, nitentia, viridi fusca, crassa, sine costis, interiori parte tenui textura, in longitudine filamentis oblongis repleta, succus viscidus est, caro viridis; saporis amari, sine odore. *Florum caules* quam plurimi, simplices, indivisi ex radice proveniunt, nodo vel fasciculo gemmarum instructi, quæ in progressu ad pollicis latitudinem à se invicem distant; rotundi, virides, nitentes, hinc inde membrana alba, tenui obtekti, quæ tegumentum gemmarum, nodo adhuc contentarum, fuerunt; intus albi, lignosi, clara, viscida aqua repleti, saporis amari. *Flores* hexapetali sunt, multum à se invicem differentes, petiolo, sex lacunis instructo insidentes; petalorum tria oblongo angusta sunt, intus egregie rubentia, oris albis, exteriori parte albo & viridi striata, cui sese rubicundus intermiscet color, anteriori parte in acutum contracta, futura extuberante instructa; ex adverso horum petalum invenitur flavum, rubro colore quasi lineatum, duabus auriculis inflexis. *Stamen* sanguineo rubrum est, tribus rotundis, flavis globulis instructum; duo reliqua quæ huic à latere sunt, non tam longa nec tam acuta

P: XII.

E

sunt,

sunt, crispata, alba, rubro colore interstincta. Sine odore vel sapore. *Fructus* ut illi *Talia* *Maravara* sed multo crassiores, in vertice coronam quasi divisam gerentes, virides, intus fasciculis parvis seriaceis repleti, in quibus semina, pulveris instar, includuntur, quæ, ut & fructuum cortex, rubescunt. Diversis arboribus insidet hæc planta, maxime illi *Caniram* vel *Cansjiram*, semper cum hoc discrimine, quod in posteriori, à qua etiam denominatur amara sit, flores inodori; ast in aliis arboribus odoris sint fortis, grati & amoeni; bis quot annis floret mensibus nempe Aprili & Octobri, diu superstes est, tardè crescit, nullis sacris, nec recreationibus ab incolis consecratur. In pulverem redacta cum *Zinzibere*, & aqua assumpta vomitum excitat & diarrhæam, morbos inveteratos, oculorum caliginem, vertiginem, paralyfin curat.

T A B. 8.

Inter plantas diversis temporibus nobis ex America allatas, etiam illæ erant, quæ illic loci *Aloë* sint, sed quia supra arbores invenirentur; hanc quod attinet, vocari posset *Aloë affinis Indica supra arborea* appellabantur, non quod *arborescentes* arbores crescens.



Māravara Tsjem bu

മലബാർ Malab.

Lucalu.

ब्रह्मब्रामin.

العرجة Arab.



MARAVARA TSJE MBO.

TABULA IX.




Ramannicè *Roukalou*, tertia species secundi ordinis. *Radix* alba, rotunda, nodosa, aspera, ab omni parte fibrillis intricatim dispositis, obsita, intus carnea, paucissimis pertexta filamentis, admodum aquea, qui humor aëri, expositus statim incrassescit & coagulat, linguam ardens imo vellicans, odoris fortissimi, saporis ingrati, ad amarum vergentis. *Folia* plura numero è radice proveniunt, quorum caules longi, extus glabri, virides, nitentes, rotundi, circa pedem rubri ibique linea interna quasi bipartiti, intus fungosi, tubulis, medulla aquea repleti, qui humor primo limpidus, crassus, flavus & rubeus evadit. *Folia* illis arboris *Bupariti* admodum similia sunt, oblonga, lata, circa caulem viridi diluta, admodum mollia; anteriori parte glabra, viridi fusca, nitentia; *Costæ* altum eminent, linguam vellicant imo ardent; odoris nullius vel paucissimi. *Florum* *Caules*, eodem modo ut folia ex radice proveniunt, circa principium crascitiem digiti adæquantes, in acutum desinentes, rotundi, subruffi, viridi fusci, geniculis & nodulis obliquis interstincti, introrsum & extrorsum intorti, in quibus flores fasciatim proveniunt, ordine decussato; ipse caulis admodum aqueus est, sed non ita ardens, sine odore. *Flores* calices sunt albi, piriformes, sine petiolo cauli annexi, ubi se aperiunt decem vel duodecim subtilia, candidissima, rotunda conspiciuntur filamenta, penicilli instar; rosas dices vel stellulas, odoris expertes, saporis aliquo modo acris. *Semen* à subtilissimo pulvere non distinguitur, coloris ruffi. Toto anno foliis & floribus instructa est, hæc planta, per multos annos in radice superstes. *Radix* cum *Manjella* vel *Curcuma* & oleo *Nucis Indicæ* in formam unguenti redacta, herpem omnesque inveteratas scabiei species sanat.

Suc-

Succus cum vaccæ urina haustus, omnis generis venenum expellit, præcipue autem serpentis *Marapentho*, belgice den *Verrotter* dicti, qui alias incurabilis. Si quis ab hoc serpente ictus per antidota superfit & non statim moriatur, corpus tamen putredine afficitur, ita ut quotidie frustra ex illo decidant, & sic miserrima morte pereat æger.

T A B. 9.

Folia hujus plantæ externa facie illis *Colocasia*, vel *Ari Aegyptiaci* similia sunt, sed pro conspecie illius haberi non potest, flos enim & semina non conveniunt.




Patitsjevi Maravara. Lat.

ಎರಡು ಎ. Malab.

Suna Sjiba

सुनाडीवा. Bram.

چٹائی چھوڑی Arab.



PATITSFIVI MARAVARA.

TABULA X.



Ingua Bramannum *Souna-Sjiba*. Quinta species secundi ordinis. *Radices*, parvæ, ruffæ, duræ, fibrosæ, saporis aquei, odoris muscosi. *Folia* plura simul è radice proveniunt: quorum caules longi, rotundi, firmi, lignosi, nigri, nitentes, hinc inde lana floccida, candida, vestiti; ubi primò progerminant, in totum illi obducti, quæ postea perit; folia juniora formam harpaginis referunt, viridia, lana candida tecti, deinde fuscescunt, oblonga, tenera, glabra, in acutum desinentia, circa pedem ut illa *Poe-Paretti* duobus circulis incisa, dura, nitentia, sine costis vel venis conspicuis; cauli videntur affixa, non inserta. Nunquam floret, diu superstes est. Folia toto anno decidunt & de novo proveniunt. *Succus* radice cum pulvere dentis *Tigris*, dolorem ex morfu serpentum & scorpionum sedat, illorumque venenum tollit, fluxum sanguinis narium sistit, sanguinem ex casu vel ictu, in corpore coagulatum, attenuat & discutit.

TAB. IO.

Non dubitarem quin hæc planta sit ex genere *Phyllitidis*; sed illud mihi non certo constat, meo judicio appellari posset *Phyllitidi affinis Indica, foliis Ari*.

Polypodium guericifolium

Pars XII Tab. 11.

Panna-kelengo. Maravara lat.

213 & 214 m3. Malab.

Kadekou. bram.



PANNAKELENGO-MARAVARA.

TABULA XI.




Anna commune nomen est omnium illarum plantarum, quæ cum *Filice* arborea aliquo modo conveniunt. Plures hujus plantæ sunt species, hæ autem cognomine *Maravaræ* indicatæ, à Botanicis Malabariensibus seorsim tractantur, & inter arborum venena recensentur, quanquam reliqua genera cum hisce maximam habeant convenientiam. Nostra hæc à Bramannibus *Kadehou* appellatur; belgicè *Wortel Varen*, *Kelengou* enim radicem dicit; quarta species est secundi ordinis. *Radix* rotunda, longa; crassa, exterius fusca & muscosa lanugine obsessa, qua se arboribus affigit; interius flava, carnea, densa, sine filamentis vel nervis, pastinacum instar, non lignosa, flectitur at non facile frangitur; humor aqueus est non mucaginosus, saporis amari, odoris gravis. *Folia* plurima numero è radice proveniunt; cancellatim fuscis & pene nigris venis pertexta, admodum rigida, vitri instar, nullo modo flexibilia, primo viridia, exinde ruffo-fusca, admodum nitentia, circa radicem, duabus eminentibus subrotundis auriculis, crispata, lata, in acutum, apice spinoso, pedetentim desinentia; humoris pene expertia, ferratim incisa. *Costa* media in adversa parte eminet. Præter hæc diversi è radice protruduntur caules, ad altitudinem duorum cubitorum, constantes ex nitente, fusca, dura, semicirculata & inflexibili costa, utrimque foliis alata; cum prioribus in omnibus conveniunt, sed dimidio longiora sunt. Nec floret, nec fructus fert hæc planta, semper virens, per multos annos superstes; circa tempus pluviosum, quam maxime progerminat, imo toto anno; radices vetustiores, funis instar arbores obvolvunt; folia vix pereunt; ab omnibus insectis immunia. Tota hæc planta, si quando supra arbores *Cansjiram* inveniatur, etiam easdem habet vires; si supra *Nucum Indicæ*; aphtas nigricantes

cu.


cura ; si supra *Alou*, omnem ardorem viscerum refrigerat ; cum *Sandalo* & lacte mulierum post aures applicata, oculorum fluxum & caliginem abigit.

T A B. II.

Nullus dubito quin hæc planta sit species *Polypodii*. Doctiss. Dom. Breynius Centur. i. adhuc alias *Polypodii Indici* species recenset ; sed cum hujus foliis minimè convenientes ; hæc à me vocatur *Polypodium Indicum foliis latissimis*.



Allypodium




Wellipanna kelengulata
Malab.
بَعْنُ قَرْفَتَا

(prae.)

Pars XII. Pag. 13.

Weli panna Kelengou maravara la
മലബാർ Malab.
وَيْلِيْ پَنَّا Arab.



W E L L I - P A N N A - K E L E N G U -
M A R A V A R A .

T A B U L A X I I . & X I I I .



Uasi diceret Belgice *Groot-Wortel-Panna*; *Welli* enim *magnum* significat; à Bramanibus *Kadehou-Maa* vocatur. *Radix* longa, crassa, subrotunda, nodosa, aspera, castaneo fusca, rigida, lignosa, intus cinerea, filamentis nigricantibus, fortioribus, nervosis pertexta, succo albo, limpido, mucaginoso repleta; odor gravis est injucundus, limosus; sapor amarus, adstringens, & summopere ardens. *Caules* tres quatuorve simul ex extremitatibus radicis proveniunt, ad altitudinem octo vel novem pedes exsurgentes, indivisi, illis *Nucis Indicæ* similes; exteriori parte spinosi, fusci, nitentes, admodum duri, interiori multis filamentis in longitudinem suffulti. *Folia* oris non ferratis magno numero ex caule proveniunt, cui, mediante costa rigidiori, ordine decussato, sunt affixa; tres digitos lata, viridi clara, rigida, duas spithamas longa, alatim expansa, siccata diu durant etiam in aperto aëre; ad amarum vergunt; odor muscosus est. *Flores* nec *fructus* unquam visui objiciuntur; sed vetustior facta planta, ex adverso foliorum lanugo quædam ruffa invenitur, pulvere repleta; qui seminis locum supplet. Incolæ ex ramis hujus plantæ, sepimenta hororum & agrorum conficiunt. *Succus* radicis vermes enecat, bilem sistit & temperat. *Folia* in pulverem redacta cum *melle* assumpta secundinas, menses, imo foetum ipsum fortiter ejiciunt; mulieres ergo cavete vobis.

T A B. 12. 13.

Clarissimus D^o. Breynius, Centur. 1. Cap. 96. | ferratis maxima India Orientalis; eandemque à Bon-
mentionem hujusmodi plantæ, forte ipsissima est; | tio sub nomine *Phyllitidis* esse descriptam.
ab illo vocatur *Filix non ramosa*, foliis integris, non

P: XII.

G

TA.


Tama Pouspaalsja maravara lat.

താമരപ്പാലു. Malab.

Bendarli.

बेदरलि. bramin.

كفغ عالجيا. Arab.



TAMAPOUVEL-PAATS J A-
MARAVARA.

VEL

ENEADI-KOURENGO.

TABULA XIV.



Ndecima species secundi ordinis; Bramannicè *Bendarly*; admirabilis cognominatur, hoc enim dicit *Tama-Pouel*. Christiani montis *S. Thomæ* vocant illam *Flagellum S. Thomæ*; Lusitani *Couda de S.^o Francisco*. *Radix* è multis constat tenuibus filamentis fibrisque curvis, lignosis; exteriori parte flavis, interiori pallidis, aliquantulum glutinosis, odoris fortis, non injucundi; saporis subsalsi. *Caulis* simplex è radice progerminat, ad altitudinem duorum circiter pedum, ubi se bifariam dividit, rursusque ad illam altitudinem exsurgit, sicque tertio, quarto, quinto & sexto; ramuli ubique ejusdem sunt longitudinis, exactissime flagellum referentes. Ipse caulis octo costis profunde striatus est, rotundus, albus & viridis, vetustior rufus; plurimis albis nervis instructus, intense cum suis ramulis erectus, aspectu jucundus. Odoris & saporis pene expers. *Folia* parva sunt, concavo reflexa, apicibus deorsum vergentibus, illorum cauliculi parvi sunt, in adversa parte sese exporrigentes, ubi folia aliquo modo convexa, interiorem formam concavam faciunt, sine nervis vel venulis conspicuis; de cætero viridiclara, glabra, nitentia, densa, admodum rigida, humore parum mucaginoso, modice repleta; totam plantam ambiunt, costis caulis affixa, ita quidem ut quatuor folia in uno circulo, sibi invicem ex adverso opponantur, ac intra unumquodque illorum spatium relinquatur vacuum; quò sequentia commodum haberent locum, pedetentim minora evadunt; usque ad quintam & sextam divisionem, ubi foliorum formam amittunt, squammis non absimilia, quibus ramulorum extremitates in totum ob-

obteguntur; florum locum suppleant, coloris viridi flavi, sub quibus ruffus invenitur pulvis, tum temporis, quando planta jam inverata, sicca & ruffa facta est. Pes caulis à radice oblongis, acuminatis, angustis obtegatur foliolis, ad altitudinem minime digiti; unde folia ordine initium habent. Saporis aquei sunt, aliquo modo ad subsalsum vergentis. Odorem, si referant, fœni exsiccati referrent. Multum temporis requiritur, antequam justam acceperit magnitudinem, per plures annos excreescens. Etiam diu superstes est vel supra arbores, vel inde desumta; ita ut nulla pene mutatio in illa vel hyeme vel æstate, vel tempore pluvioso vel sicco, multò minus vel flores vel fructus videantur. Arbores quibus plerumque insidet sunt *Mau*, *Faca* & *Alou*. Radix trita lacte permixta, jejunoque stomacho epota, nauseam ventriculi sistit, menses promovet, pulmones & lien emollit, hydropis in curat. Tota planta aquæ incocta & lacte *Nucis Indicæ* permixta dysentericiæ medetur; veneno resistit; cum Saccharo Arboris *Kavi* vel *Karimpanna*, generationem adjuvat tam in viris quam in fœminis, imo & fœcunditatem promovet. Nota. Arbor hæc *Karim-Panna* vel *Palmeira Brava*, prima Parte Tab. IX. pag. XI. descripta, non est illa arbor, quæ ab incolis Cylanensibus *Talas Gas*, vel *Talagaba* nominatur, ut doctissimus D^o. *Arnoldus Syen* piæ memoriæ, ex aliquali foliorum convenientia judicavit. Præter hæc salutiferas vires, quæ multæ & revera egregiæ sunt; incolæ adhuc alias illi adscribunt, quæ extra rationem & ridiculæ videntur. Nugis non delector, adeoque illas enarrare non lubet, nec ex parte nec omnes; omnium loco sit sequens hæc narratio. Firmiter persuasi sunt incolæ, ut si duobus hominibus ramus cum priori divisione detur, atque ille ita laceretur, ut quisque justam dimidia-tam partem retineat, sudore humectet, & continuo penes se calefaciat; illi vesano quasi amore erga se invicem ferantur; sed si alter illorum partem suam amittat vel à se deponat, amorem quidem suum servet, ab altero tamen ita odio, & quidem tanta cum averfione habeatur, ut ipsum vel

vel videre, vel de illo cogitare non sine tædio possit; usquedum & alter etiam suam deposuerit partem; quo facto uterque in integrum restituatur. Nec ad hoc solum sed etiam ad libidines venereas excitandas & incitandas adhibetur; imo inter personas ejusdem sexus, quo amicitia inter illos perpetua fiat; extenditque se hoc mysterium eo uique, ut non vereantur herbam hanc clanculum insuere vestibus, calceis & armillis illorum vel illarum, quorum amicitiam sibi velint vendicare. Præterea ab illis habetur pro clypeo, contra omnis generis fascinationes, incantationes, execrationes, atque omnibus bene fore, modo secundum regulas ab illis præscriptas adhibeatur; sed illæ tot cavillationibus, observationibus & determinationibus sunt implicitæ, ut merito à sapientioribus detestentur & repudiantur. Quæ quamvis fabulosa sint & incerta, hoc tamen verum est, plantam esse omnino præstantissimam, cujus virtutes excellentissimas & efficacissimas ex asse describere, majorem requireret paginam. Doctissimus atque excellentissimus D^o. *Paulus Herman*, Medicinæ Doct^r, jam vero, Lugduni Batavorum Botanices Professor celeberrimus, obnixè à me petiit ut illam, cum in Insula Ceylone degeret, transmitterem, sed licet totæ regiones & illarum incolæ, ex auctoritate principum illorum, mihi ad manum essent, nunquam tamen illam potui consequi; sed jam ad iter accinctus, transmissa mihi est per celeberrimum Dom. *Alexandrum* istius regionis indigenam, Archiepiscopum Montis & Christianorum Sancti *Thomæ* in insula Malabariensi.

T A B. 14.

Multi diversique docti viri, quasi admiratione rapti fuerunt super hujus plantæ figuram & virtutes, miraculum enim magni & nunquam satis laudati videtur creatoris. Expertissimus, perdoctissimusque D^o. *Breinius*, Centur. 1. Cap. 92.

illam descripsit nomine *Selaginis India Orientalis*; sive *Plegmaria admirabilis Ceylanica*. Nostri autoris descriptio prolixior est, viventem enim illam viderat, sed *Breyonii* delineatio multo accuratior.

Diplazium malabaricum

Pars XII. Tab. 15.

Pirapanna Maravara. Lat.

മുളയ
Malab.

يقع عتاء Arab.



P A R A - P A N N A - M A R A V A R A.

T A B U L A X V.




Uasi diceret *ramosa*, *Paraa* enim ramum significat; nona species secundi ordinis; Bramannice *Bosaya*, æque supra terram ac arbores crescit. *Radix* fusco ruffa, rotunda, geniculata; pilosis vestita, fibrillis, pollicem crassa, interiori parte rubra, carne densa, fuscis nervulis pertexta, humore viscido repleta; subamara, astringens, odoris gravis & muscosi. *Caules* numero plures è geniculis proveniunt ut illi specierum *Vallia*, belgice *Kruipers*; formæ & figuræ ut illi *Kari-Welli-Pannæ*, sed non tam altè exsurgentes; viridi clari, succosi. *Folia* etiam ut illa *Kari-Welli-Pannæ*, excepto quod non tam profunde sint incisa, neque etiam tam rotunda; sed in hoc differunt, illa quasi rotunda pomula gerunt, hæc rugosistantum, fuscis, obliquis lineis (illorum semina) obducuntur; sine sensibili odore vel sapore, aliquo modo tamen gravi & injucundo. Nec flores habet nec fructus, præter fuscam illam hirsutiem, quæ exsiccata, pulveris instar avolat, & supra arbores incidens, novam plantam producit, sicque suum genus conservans. Non tam diu superstes est, hæc planta ut quidem reliquæ, biennio enim vel ad summum triennio radices interiunt, & facillimè exsiccantur. Adversus morbos adhibetur endemios, febres intermittentes curat; tussim sedat, alvum laxat. *Succus* cum sanguine gallinæ permixtus ardorem expulvere pyrio & ferventi oleo contractum refrigerat.

Kal-panna-maravara Lat.

കാല പന്നാ മാറവാരാ Malab.

فجل يَغْنُغ Arab.



KALPANNAMARAVARA.


TABULA XVI.

BRamannes dicunt *Alpam*; etiam supra arbores crescens, sed in solo petroso, unde & nomen consecuta est; *Kal* enim petram dicit. *Radix* tenuis, fibrosa, pilosa, nigra, densa, nervosa, intus cinerea, odoris fortis; saporis aliquo modo subamari. *Caulis* simplex è radice exfurgit, ad altitudinem pedis, in multos se dividens ramos, viridi clarus, depressus, angulosus, laciniis ab una parte striatus, intus aqueus, hinc inde pilis obsessus. *Folia* mutantur in ramos; costa enim folium constituens, se longius exporrigen, unaquæque incisio in privatum folium, folium vero in ramulos excrescit; qui iterum multa producant folia, oblonga, anteriori parte obtusa, tribus quatuorve punctis rotundiolis profunde incisa, unumquodque punctum nervulo costæ mediæ infigitur, rami & folia communi cauli sunt annexa, decussatim disposita, glabra, viridi clara; *costa* media in adversa parte eminet; in qua plura sese oblonga, ruffo fusca exhibent ova, seminis locum suppleant. Admodum tenera est hæc planta, umbram amans, annua, è radice de novo progerminans, tempore pluvioso à mense Aprili ad Septembrem usque. Adversus morbos chronicos, hecticos, tussim, dispnæam adhibetur cum *Para-Panna* & *Kari-Welli-Panna*.

Kari-beli-panna maravara Lat.

കരിവേലിപന്നം. Mal.

فخاري و هلي پغتاء Arab.



KARI-WELLI-PANNA
PARAVARA.

TABULA XVII.



Octava species secundi ordinis, five *Panna major sylvestris*; Belgice *Groote Wilde Panna*, *Kari* enim *sylvestre* dicit; Bramannice *Maa Panna*; supra omnium generum arbores crescens. *Radix* aquea, nigra, nodosa, circumquaque fibris fuscis, capillatis obsita, carne densa & fragili; odoris & saporis pene expers. *Caules* è radice ad altitudinem quinque vel sex pedum exsurgunt, rigidi, lignosi, pene quadrati, viridiclaro, ab una parte lacinia excavati, interiori parte albo pallidi, humidi, simplices, indivisi, odoris ingrati. *Folia* ut illa *Nella Panna* proveniunt, spithamam longa, pollicem lata, acuminata; *costa* media in adversa parte parum eminent, instar caulis, viridi clara; ab hujus utraque parte foliorum ora, rotundis sunt incisa laciniis, similitudinem parvorum foliorum referentibus; in adversa parte supra costulas transversas, parva, rotunda, fusca reperiuntur ova, & quidem magno numero, nitidissime decussatim disposita; præter illa nullos habet vel flores vel fructus; diu superstes, in totum sua natura quoad mutationem nempe cum *Nella Panna-Maravara* conveniens. Tota planta adhibetur in Morbo Endemio, ille est languor vel infirmitas membrorum, decoloratio vividi cutis coloris; indigenæ enim non tantum instar mortui pallidi sunt, sed & flavi, imo ipsa oculorum albedo, dispnæa & intolerabilibus corporis doloribus continuo subjecti, qui ex malignis ventis nocturnis, & irregulari vita causantur. Cadavera horum dissecta, semper lien deprehenditur lapidis instar induratus.

Asplenium foliatum Host.
canaliculatum P.

Pars XII Tab 18.

Nella pinna maravara Lat.

نالا پینا ماراوارا
نالا پینا ماراوارا



NELLA-PANNA-MARAVARA.

TABULA XVIII.

BRamines dicunt *Pannaa* septima species secundi ordinis; à virtute & viribus nomen habens, quasi diceret *Panna bona*, *Nella* enim bonum vel salutare notat. Crescit supra arbores qui in petroso inveniuntur solo, quare etiam & *Kal-Maram-Panna* nominatur. *Radix* nihil aliud est quam massa vel fasciculus multarum fibrarum, filamentorum capillarium & radicularum, quæ fusco nigræ, lignosæ, alia adhuc muscosa hirsutiae complicatae & intricatae sunt. Odoris sunt gravis, saporis subamari, limpidi humore repletæ. *Caules* plures simul è radice exsurgunt ad altitudinem trium quatuorve pedum, simplices, indivisi, rotundi, glabri, castaneo fusci, nitentes, rigidi, lignosi, ab una parte plani, sed lacinia excavati; adhuc teneri summitates circumflectuntur & corrugantur, fuscosa lanugine, quæ deinde perit, vestiti, sine odore vel sapore. *Folia* oblongo angusta sunt, gradatim utrinque incisa, in acutum desinentia, dura, rigida, erecta. *Costa* folium inæquale dividens in adversa parte eminet. Sine odore vel sapore. Per multos annos in radice superstes est, bis quotannis progerminans mensibus nempe Septemb. & Octob. nec florens nec frugens. *Radices* in pulverem redactæ & cum bubuli lacte epotæ, disenteriam vel tenesimum sistit. *Folia* contusa cum illorum succo assumpta, alvum leniter laxant, sanguinem purgant. Tota planta in formam balnei præparata, & pro infessu, ad umbilicum usque, usurpata, mirum in modum partum promovet, pituitam pulmonum attenuat, lienem induratum & obstructum aperit & emollit, si quando succus cum radice arboris Canellæ jejune assumatur.

Acrostichum flagelliforme L.

Pars XII Tab. 19.

Pannā Kara-maruvāra L.

2 m

Malab.

Pannā

पन्न

bram.

عَنْج

Arab.



PANXAMARA-MARAVARA.

TABULA XIX.



Sexta species secundi ordinis; Bramannes dicunt *Thola*; etiam supra arbores, loco petroso dispositas, crescens. *Radix* ab una parte excurrit, curva, nodosa, exterius fusca, interius ruffa, lignosa, plurimis fibris capillisque nigris, circa inferiorem partem coriacea hirsutie, cui se corticibus arborum affigit, obseffa; odoris gravis & ingrati, saporis amari. *Caules* plures ex radice proveniunt, ad altitudinem quatuor vel quinque pedum, tenues, glabri, nitentes, intus pallido virides, carne densa, albis nervulis secundum longitudinem pertexti; ab una parte rotundi, ab alia plani, ubi costa quædam extuberat, in medio & circa oras glabri, ubi duæ foliorum series sex vel septem numero, decussatim videntur, quibus caulis ab utraque parte alis quasi instructus videtur, quæ plumarum instar flammearum sese offerunt; vetustiores factæ punctis & dentibus exporriguntur, caudam referentes flammearum; rigidæ, flexiles, viridi claræ, siccæ, amaræ, odoris gravis & ingrati. *Folia* forma & figura sunt diversa, juniora tenuia, parvum digitum longa, duos lata, in acutum desinentia, posteriori parte parum rotundiora, rigida, fuscoviridia, nitentia, oris glabra, cum costa in utraque parte eminente; vetustiora sese ad sesque spitham extendunt, quando margines ferratim inciduntur, costæque altius extuberant. Nec floret nec fructet, per multos annos superstes, continuo, circa initium temporis pluviosi, & quidem toto anno, æstate humida, è radice progerminans. Cum *Saccharo* in syrupum redacta, tussim, morbum endemium; omnia pulmonum vitia, dispnæam, morbum lunaticum, phtysin curat.


Scindapsus pectinatus.

Pars XII Tab. 20.

Elitta di maravara lat.

കവുക്ക. *Malab.*

خهلن طاضی. *Arab.*



(p. 21)


Pars XII. Tab. 21.

Elettaria maravara Lat.

ਅਲਿਅਕੁ. Mal.


سومالا. Ar.

Soumala Bram.



ELLETTADI-MARAVARA.

TABULA XX. & XXI.

 *Oumalla* Bramannes dicunt, duodecima species secundi ordinis. *Radix* sesquidigitum crassa, rotunda, geniculata, caudarum instar magnorum, nigrorum agrestiumque scorpionum; alba, viridipallida; intus fungosa, admodum aquea, hinc inde multis crassis, curvis carnosisque radicibus, ab illa parte ubi alba, obsessa, quibus se corticibus arborum affigit; intestina referentes glabra & nitentia; odoris sylvestris & muscosi, saporis ingrati; adstringentis. *Folia* plura numero ex radicis extremitate proveniunt, ut illa *Anseli Maravara*, quorum caules admodum glabri, cavi, virides, nitentes; illis folia insident simplicia, oblongo angusta, tres pedes longa, duosque & dimidium lata, viridi clara, fungosa, glabra, admodum nitentia, ut illa *Ponnam-Pou*. *Caulis* ab una parte ad supremam excurrit. *Costa* media in adversa parte eminet; folia inter costas profunde sunt incisa; multis in locis magnis foraminibus, vel ocellis, veluti fenestris perforata; decidua, illic loci radicem constituunt, geniculis interstinctam; & illa quoniam in vertice semper nova producat folia, quæ iterum folia, illæque iterum novas constituent radículas & hæ continuo rursus proserpent, hinc fit ut arbores in totum pene ab hac planta obtegantur. Nec floret nec fruet, per multos annos superstes, imo pene perennis, arbores pene suffocans. Nullius in Medicina usus.

Teka-marabara.

മരവൃക്ഷ. Malab.

Zuca keli.

रुक्कोकी. bramin.

زاج. و زاج. Arab.



THEKA-MARAVARA.


TABULA XXII.



Ecundum Bramannes *Rou-Kakely*; prima species tertii ordinis; sic vocata ab arbore *Theka*. Radix admodum fibrosa est, tenuis, lignosa, dura, rigida, ruffa, ab una parte fasciæ (quase arboribus affigit) ad aliam, veluti funiculis reticulatim excurrens; ex hac radice fascia, nodus progreditur, in principio octo lateralis, sed major evadens & intumescens, quadratus, cujus latera plana sese in medio aliquantulum quasi costa extollunt, unde in junioribus nodis octo illa constituuntur latera; nodus ipse oblongo angustus est, in acutum desinens, viridis, glaber, nitens, cortice crasso, viridi, densa carne repletus, humor viscosus est, qui nodo disrupto, filamentis extenditur, telæ araneæ instar, saporis subfalsi. Folium ex unoquoque nodo, unicum provenit, oblongum, ovale, vertici nodi insidens, crassum, lene, glabrum, nitens, ut illud *Ponnam-Pou-Maravara*; limbo & viscoso humore repletum, in medio rectæ partis futura striatum, textura densa, rete referens, saporis subfalsi. Nodus si pro fructu habetur, fruetur, sed in fructu nullum reperitur semen, nec floret; tamdiu superstes est planta, quamdiu arbor cui insidet supermanet; terræ mandata nequaquam progerminat. Planta cocta & in formam lotus adhibita, omnis generis catharros & gravedines sanat. In pulverem redacta & false mixta Hydatides. Cum foliis *Cassia fistulæ* vel *Connæ*, *Zingibere* & *Muria* supra ignem siccata & torrefacta, herpeti medetur, variolis, scabiei. Pulvis fructus cum stercore glirium circa inferiorem abdominis partem, cum melle, oleo *Nucis Indicæ* illitus, urinam brevi tempore promovet. Succus nodi auribus inditus, illarum apostemationem juvat, surditatemque accidentalem abigit.

Tsjerou. Tecka maravara, Lat.

അറുവ. Malab.



TſEROU-TECKA-MARAVARA.

TABULA XXIII.



Uasi dices *Theka Maravara minor*; Bra-
mannicè *Bouka-Kely* cum priori in omnibus
convenit; excepto quod omnes partes sint
minores, fructus rotundiores. *Folia* in
acutum non desinant sed in extremitate ex-
caventur, & in duo dividantur. Sapor,
odor, vires, usus idem.



Wellia Theka-maravara
sive *Mau-marabara* Lat.

മലബ. Malab.

Tolassi. Bramin.

نقح ووعضا Arab.



WELLIA-THEKA-MARAVARA

VEL

MAU-MARAVARA.

TABULA XXIV.



Uasi diceret *Maravara magna*, tertia species tertii ordinis; Bramannum lingua *Tolassi*; radices habet plurimas, parvas, tenues, lignosas, curvas, nigricantes, fasciatim arboribus *Theka* & *Mau* insidentes, odoris & saporis expertes. *Folia* ex radice proveniunt, primò brevia & simplicia, ad longitudinem cubiti excrescunt; in adversa parte convexa in recta concava, ubi folia glabra, plicas aliquas referunt, quæ penes caulem profunde in puncto folii in nihilum abeunt. *Costæ* quatuor vel quinque in adversa parte altum eminent; concham instar illius S. Jacobi in interstitiis, conficientes. Folium ipsum admodum rigidum est, caro densa, lenta, coriacea, flexu difficile, viridi fuscum, glabrum, nitens. Quo major evadit eo magis in pede incrassatur, imo in nodum evadit, qui prius trigonus, exinde glaber est & rotundus, ex quo, similitudinem fructus *Thekæ Maravaræ* referente, deinde nova folia, prioribus nempe deciduis, progerminant, ex unoquoque nodo unum non plura; nodi ipsi ex flavo virides sunt, carnosî, humore glutinoso, sicut & folium, repleti; odor exiguus est; sapor inter falsum & acidum, sed nauseabundus. Ex cavofoliorum caule, longa, angusta, plano rotunda, viridis excrescit spica, similitudinem referens parvi serpentis, squammis, in duas series, obtecta, cujus cauda longa, nuda, glabra, viridis, ab una parte futura striata. Sub foliolis illis squammosis *semina* concluduntur; intra unamquamque squammam unicum, depressum, rotundum, viride, cucullula incurvata obtectum, cujus cavitati affigitur, cuculla ipsa, brevi pedunculo, cauli; spica ad maturitatem perducta, squammæ sese elevant, semen excidit. Nodi quo vetustiores & ma.

maiores, eo etiam maiores sunt spicæ & semen, quod viride humore etiam viscoso repletum; saporis subsalsi. Nec tempus nec ordinem observat hæc planta; semper progerminans; ad multos annos, modo arbores maneant, superstes; quæ ad bis & ter centum annos, ut illa genera arborum *Alou* perdurant, ni ab hisce & aliis *Maravaris* ita opprimantur ut brevi pereant. *Radices* capillares tritæ, & capiti raso impositæ, furorem in febribus ardentibus, imo extra illas, curat, modo in tempore adhibeantur, imo morbum ipsum impediunt. *Nodi* fructus, purgant inveterata & maligna ulcera, aurium dolorem sistunt, non tantum sed & totius capitis; somnum excitant, evaporationes biliosas expellunt. Plantis pedum applicati, febres intermittentes & illarum symptomata tollunt. Tota planta in formam cataplasmati redacta, & circa lumbos applicata, partum promovet, menses & urinam, semper aliquid virium illarum retinens arborum quibus insidet.



Pholidota imbricata.

Pars XII Tab. 25.

Katou. Theka-marabara Lat.

Tholassi. Malab.

Tholassi. bramin.



KATHOU-THEKA-MARAVARA.

TABULA XXV.



Erinde est ac si diceret *Maravara sylvestris*, *Kathou Theka* enim *sylvestre* dicit; quarta species tertii ordinis; Bramannes vocant illam *Tholassy*. Radix flava, aquea, intus alba, filamento fortiori nigricante suffulta, fractu difficilis, circumflexa & in longum sese extendens. Ex radice folia progerminant ut illa *Wellia-Theka-Maravara*, conformata & disposita ut illa *Thalia Maravara*, excepto quod multo angustiora sint, tenuiora, flexibilia; de cætero illis *Wellia-Theka* in omnibus similia. Nodi vel bulbi nova quidem producant folia, nunquam vero flores, fructus vel semina. Rarissime invenitur hæc planta & non nisi in maximis & densissimis sylvis; arbores quibus insidet vetustissimæ sunt, transplantationem non admittit. Medicis Malabariensibus ignota est, ab illis nunquam visa; traditione tantum nota; viderunt tamen, sed cum summa admiratione, cum illam illis exhiberem, mihi à rege *Calicot* sive *Magno Samoryn* transmissam. Radices siccatae in folliculis repositæ serpentes abigunt; in pulverem redactæ & assumptæ, veneno resistunt ex morfu canis rabidi contracto, vulnera & omnem illorum malignitatem sanant; Bulbi per medium dissecti & affati, omnia apostemata resolvunt. Bubulis venenum sunt, furibundi enim evadunt, si de illis comedant.

Angraceum carinatum.

Pars XII. Tab. 26.

Katou kaidā maravara Lat.

കടുകൈ മലബ.

Boin-cadeki.

भड़कैके ब्रामि

فخاطو قحايضا Arab.




KATOU-KAYDA-MARAVARA.

TABULA XXVI.



Quinta species tertii ordinis ; Bramannice *Boin-Kakely* ; planta est quæ æque supra arbores quam in terra progerminat. *Radices* longæ, curvæ, tenues, fibrosæ, filamento albo intus instructæ, humore viscido repletæ, sine notabili odore vel sapore. Ex hisce *Bulbus* provenit, pene cum illo *Kathou-Theka* conveniens, viridifuscus, glaber, nitens, in acutum desinens, hinc inde futuris striatus, cujus caro viscosa est & viridis, fibris lignosis in longum pertexta, sine odore, saporis subasali. *Bulbus* è vertice prolongatur, triaque constituit folia longa, ensiformia, tres pedes alta, pollicem lata, viridia, glabra, nitentia, complicata ; utraque parte tribus nervis instructa, rigida, erecta, fractu facilia, succo glutinoso repleta. *Costa* media in adversa parte altum eminet. Inter hæc folia, è medio bulbi, simplex, rotundus, viridis, glaber, nitens, protruditur caulis, arundinis instar geniculatus ; ex quo flores proveniunt ; eodem modo, ut illi *Angeli-Maravara* excrecentes, forma cum illis *Anantaly-Maravara* convenientes, excepto quod petalorum sextum, majorem habeat cucullulam, & albis capillis instructa sit ; flores exteriori parte viridi fusci sunt, ad rubrum vergentes, interiori, eximie rubris, albis, viridi admodum clavis, purpureisque venis striati & notati ; accuratissime maculis flavo albis ornati ; circa inferiorem petioli partem, lingula fusca videtur, postea in spinam evadens ; odoris gratissimi. *Fructus* in omnibus cum illo *Angeli-Maravara* convenit ; sic & *semen*. Diu superstes est. *Bulbus* bis vel ad summum ter flores producit, tum perit, sed è radicibus de novo progerminat, sine ullo, vel hybernici vel æstivi temporis, discrimine. *Succus* radicis si supra arborem *Kansjira* inveniat, amarus est, alvum laxat, bilem promovet. *Succus* bulbi & foliorum omnem adustionem ex pulvere pyrio, oleo

oleo ferventi, vel igne causatam, cum sanguine canino mixtus, tollit. Pulvis venenum, sive externum sive internum expellit. Si supra arborem *Fava*, vermes intestinorum enecat, febris resistit, ventriculum corroborat, flatus dissipat. *Succus* cum carne totius plantæ in formam cataplasmatidis redactus apostemata emollit, &, sine dolore, ad maturitatem perducit.



Basaala-poulou marabara Lat.

പാലാപ്പൂല . Malab.

Keli.

केळी . bram.

بَعَثَالَا پُولُغ Arab.



BASAALA-POULOU-MARAVARA.

T A B U L A X X V I I.



Proprio nomine *Basaala-Maravara*; cognomen *Poulou* additur, omnes tales significans plantas, quarum semina, granorum instar, in spicis inveniuntur; Bramannicè *Keli*; tam supra arbores petroso in loco positas, quam supra petras ipsas crescens. *Radix* ex multis filamentis & fibris conflatur, alba, intus carneo aqueoque humore repleta, odoris gravis, saporis amari. *Caulis* è radice progerminat, sesquipedem longus, ab omni parte, foliorum pedibus, circumvolutus, quæ ex se invicem proveniunt, ut illa *Thalia-Maravara*; non decussatim disposita, sed giris sese in orbem flectentia, caulem ipsum nunquam detegentia; angusta, spithamam longa, tres digitos lata, superiori & inferiori parte in acutum desinentia, mollia, lenia, viridi clara, oris glabris, costis plicisque sulcatis; fracta multæ fibræ ad longitudinem cubiti ex illis extrahuntur, telæ araneæ instar, humore aqueo instructa. Odoris sylvestris, saporis amari. Inter folia ex radice florum caulis producitur rotundus, viridis, lignosus, glaber, rigidus, in quo flores fasciatim dispositi videntur; eodem modo ut illi *Angeli-Maravara* provenientes; minutissimi sunt; tam eleganter confecti, ut pro merito nec delineari nec describi possint; egregiè miniato rubri, monopetali, petalum ipsum soleæ instar equinæ circumflexum, cujus ora filamenta serica dependentia referunt; in medio orbis è diametro duo sese opponuntur globuli, similitudinem *testudinum* cum omnibus illarum partibus repræsentantes; illorum petioli in altum caulis diriguntur, circa pedem foliolo parvo viridi instructo; gratissimi & amoenissimi odoris. *Fructus* ex florum petiolis producuntur, illis *Angeli-Maravara* in totum similes, excepto quod hi in vertice ampliores sint, & circa pedem in acutum desinentes. *Caule* florifero emoriente, è radice novus denuo progerminat, sole supra ipsum

fulgente, semper pene florens, idque singulis quinque mensibus bis. Sylvas, & loca inculta amat hæc planta, atque ideo non sine magno labore & difficillime invenitur. Malabarienses enim nullos medicinales excolunt hortos; si quo indigeant medicamento, illud ex sylvis & agris sibi comparant. Bilem purgat, antifebrilis est; terminos, five motus epilepticos infantum, morbillos curat, diaphoretica est.



Katou Lonnam-maravara L.



KATOU-PONNAM-MARAVARA.

TABULA XXVIII.



Uasi diceret *Maravara sylvestris*, aurea; septima species tertii ordinis; lingua Bramanum *Pon-kely*. Radices tenues, breves, fibrosæ, fuscæ, carnosæ, subflavo, crasso, lacteoque humore repletæ, saporis acris, adstringentis; odoris non injucundi. Ex radice caulis producit, primùm unico constans folio: *Folia* numero tria ex radice proveniunt, pedibus intra se invicem complicatis. Unum illorum parvum est; reliqua duo majora & longiora, decussatim disposita, in adversa parte costis eminentibus secundum longitudinem dotata; in recta glabra, plana, futuris notata, coriacea, lenia, viridifusca, acuta, rigida, flectuntur, sed non facile franguntur. Inter hæcce *caulis* erumpit floriferus, perinde ac ille *Basaala*; sed striatus est & angulatus, viridis, rigidus, lignosus, intus filamentis & nervis lentissimis instructus. *Flores* eodem modo ut illi *Basaala* in caule proveniunt, flavo-clari, pentapetali, illorum tria longa, parva, angusta, duo rotunda, circumflexa, apicem constituentia cum procumbente penicillo, illud cavum est & circumflexum. Odoris admodum grati. *Fructus* ut illi *Basaala* sed pentagoni sunt: Semel tantum floret hæc planta & interit, mensibus Januarii & Februarii; nunquam è radice de novo progerminans. Solem amat & solitudines; descissa & extra solem posita, deflorescit; sub sole reviviscit, quod rarum & in paucis plantis deprehenditur. *Succus* cum radice trita, adustionem, Carcinomata, Gangrænam curat. *Succus* foliorum omnem ardorem febrium sistit malignarum; magna efficacia humorem superfluum ex tumefactis manibus, brachiis, pedibus, illic loci pedes *S. Thomæ* dicti, qui sæpius ita intumescunt, ut crassitiem hominis superent, expellit.

Nipholobolus carnosus Po

Pars XII. Tab 29.

Marella-mala maravara. Lat.

മറുവള്ളി . Malab.

Bendarli. Bram.

बोदवल्ली

مغرة مطية . Arab.



MARETTA-MALA-MARAVARA.

TABULA XXIX.



Rima species quarti ordinis; Bramannes dicunt *Bendarly*; supra arbores initium sumens, seseque illis circumvolvens. *Radices* admodum tenues sunt & subtiles, brevioribus nigrisque fibrillis, corticibus sese insinuantibus, illæ lignosæ sunt, continuo iterum alias protrudentes, viridi claræ, hirsutæ, vetustiores nitentes, fusco ruffæ, membrana, quæ deglubi non potest, obtectæ. *Folia* in parvis fuscisque petiolis, plura numero ex ramulis prodeunt, parva, pyriformia, depressa, ab utraque parte glabra, viridia, nitentia, crassa; carnosa; juniora hirsuta, intus viridia & humida, ita ut fracta aquarum guttæ per corticem exsudent; formam margaritarum depressarum referentia. Saporis aquei, salsi, acidi. *Fructus* in ramulis, quibus folia affiguntur, proveniunt; juli sunt oblongo angusti, plano depressi, circa superiorem partem plani & glabri, parva sutura in longitudinem striati, viridi nitentes, circa inferiorem reflexis oris, in ipsa cavitate, sericeis albisque membranulis instructi, quæ postea ruffescit, in pulverem mutatur, & semen exhibet; saporis subsalsi, odoris gravis & fungosi. Semper folia profert & fructus, sine ullo temporis discrimine, semel arbori affixa, nunquam deserit, cum illa vel vivens vel moriens. *Succus* foliorum cum aqua juniorum Nucum Indicæ permixtus, dentes firmat, intumescentiam gingivarum tollit. In morbillis cum fructu adhibetur, citissimè illos produciens. Cum planta *Tandela Kotti*, omnes affectus venercos sanat.

Leptochilus

Pars XII Tab 30.

Vall. rura. Kooz maravura Lat.

മളളു മീന കോഴി മലാബ. Malab.

Gagana. bramin.

واللي واضحا فصحة Arab



VALLI-VARA KODY-MARAVARA.

TABULA XXX.




Ecunda species quarti ordinis, quasi diceret *Hedera arborea venenata*. *Valli* enim *hedera*, *Vara* venenum, *Kody* talis planta est, quæ ligationi, funum instar, apta deprehenditur. *Radices* fusco ruffæ sunt, rigidæ, ligneæ, saporis subamari. *Rami* cinereo virides, hinc inde nodosi, cortice tenui, interiori parte albi, densi, lenti, ligno duriori, qui funis instar flectitur & ligaturæ inservit. *Folia* ab utraque parte ramulorum sine ordine videntur, spithamam longa, sine caule; lenia, flexibilia, viridiclarâ, in adversa fusciora, costa, in adversa parte eminente, instructa. Circa pedes foliorum *fructus* proveniunt hastiformes, manubrio glabro, viridi instructi, de cætero rotundi, hirsuti, coriacci, pulvere, sive semine ruffo in adversa parte obducti. Diu superstes est hæc planta semper foliis & fructibus ornata. *Folia* cum illis *Avanaco* calce trita in totum antipodagricum medicamentum conficiunt, in formam cataplasomatis redacta & applicata.



Arana-panna. Lat.

അറാണ പന്ന. Malab.

عَرَهَاءُ / يَغْنَأُ. Arab.



A R A N A - P A N N A.

T A B U L A X X X I.



*C*ules ex radice simplices exsurgunt, rotundi, interius lato sulco profundè striati, rigidi, lignosi, spadiceo rubri. *Folia* in duabus seriebus geminata proveniunt, illorum pedunculi brevissimi; de cætero oblongo angusta, in cuspidem desinentia, in oris angulis rotundis excisa, rigida, viroris vividi ac nitentis, maximè in adversa parte ubi *costa* eminet, in adversa duæ ovorum series extuberant, quæ rotunda, croceo fusca, rubra, oram folii circumcingunt & in recta parte vestigia ac notas inprimunt, aspectui jucunda. In medicina nulum habet usum.



Lycopodium

Pars XII Tab. 32

Valli-panna Lat.

മുളുങ്കം Malab.


وعلى ينعج Arab.



VALLI-PANNA.

TABULA XXXII.


NAscitur in petrosis, frutices scandens. *Caules* tenues & lignosi. *Folia* in petiolis, qui ex brevioribus caulium tuberculis geminati erumpunt, terna proveniunt oblongo-angusta, cuspidata, tenuissima, lenia, viroris in recta parte vividi, in adversa dilutioris. *Costa* media utrinque eminent, ex illa venæ subtilissimæ ac condensæ, oblique in oram ipsam excurrunt, ibique minutissimis crenulis incisæ. Nec floret nec fruet. *Folia* in vaccino lacte trita venenum abdominis præcordia & viscera urens expellunt.



Tjeru-välli-pänna wranapoly. Lat.

മല 3 മറ്റു പലത Mal.

جَهْرُو وَالِي چنّا Arab.



TS FERU-VALLI-PANNA.

VEL

WARAPOLI.

TABULA XXXIII.


P *Anna* species est, maxime cum illa conveniens, cujus folia apicibus sunt oblongis: sed hæc minora, æquabili ora sine apicibus Ignoti usus.



Tsjeria Vallipanna. lat.

മലബാർ Malab.

واللّٰه عتّا Arab.




TSJERU-VALLI-PANNA. Altera.

TABULA XXXIV.



LTiam *Panna* species, arbores scandens, solo gaudens arenoso. *Caules* tenues, lignosi, rotundi, virides. *Folia* in furculis tenuibus, rotundis, lignosis, qui ex adverso caulium geminati erumpunt; plura congregatim, ac in duabus seriebus proveniunt, oblongo angusta, cuspidata, tenuia, plana, in oris apicibus oblongis, crassiusculis eminentia; viroris in recta parte saturi, in adversa dilutioris. Saporis & odoris expertia. *Costa* media in utraque parte extuberat. *Floribus* & *seminibus* destituitur; nec ullius in medicina usus.



Pinna-Valli Lat.

Malab.

عنعنہ والحمى Arab.



PANNA-VALLI.

TABULA XXXV.



COnvolvulus nascens in arenosis, undique *radiculis* fibrosis, nigricantibus vel supra terram repens, vel arboribus sese affigens; *caules* tortuosi sunt, rotundioli, viridi fusco ac crasso cortice, filamentis lignosis per-texti. *Folia* in cauliculis proveniunt planis, plana & glabra, exteriora versus inflexa, viroris in recta parte fusci & valde nitentis, circa oras albicante limbulo, ac cuspidibus acutis, rigidis, anteriora versus reflexis, munita. *Costa* media utrinque altum eminet. Nec floret nec fruet. *Succus* cum oleo *Sergelim*, *Zinzibere* ac *Pipere* longo permixtus, capitique illitus, cephalalgiam biliosam emendat & abigit.



36. *Hottonia indica*
(Hydrophyton perfoliatum)
 Pl. Ind. I. 422.

38. *Scirpus squarrosus.*

Pars XII Tab. 36.


Tsjadaen-tsjira. Lat.

മാടമലി. Malab.

Amuli.

आवली. Bramin.

جياضهين حيراه. Arab.



Tab. 38.



Motta-pullu. Lat.

മാടമലി. Malab.

مطاطي وولحو. Arab.

Tab. 37.



Puem-peda. Lat.

മാടമലി. Mal.

پوهن پخوفا. Arab.

TSJVDANTSERA.

TABULA XXXVI.



Plantula nascens in arenosis & sudo solo. *Radix* fibrosa, albicans. *Cauliculi*, qui ex radice plures exsurgunt, simplices, rotundi, aqueo albicantes, tortuosi, geniculis ordine interstincti, internodiis ad apicem contractionibus. *Folia* angustissima, *fœniculi* instar dissecta, in geniculis verticillatim cincta, viroris in recta parte saturi ac levi nitoris, in adversa dilutioris. *Flores* hinc inde solitarii, ex origine foliorum, in geniculis, pedunculis oblongis, tenuibus, rotundis, ac nonnihil ex viridirubescens, prodeunt, tetrapetali, surrecti, cuspidati, candidi, exteriora versus reflexi, collulo oblongo, viridi, in medio, in colli orificio, lanugine flava obsiti. *Staminula* in illis duo, apicibus rotundiolis, candidis; *stylus* in medio apparet. *Florum gemmæ* conicæ. *Calyx* ex quatuor constat surrectis, angustis, cuspidatis foliolis. Tota planta odoris est subacris & grati. *Flores* cum *Gingibere* & *Cardamomo* in sero *lactis* potiunculam antidysentericam suppeditant.

PEM-PEDA.

TABULA XXXVII.



Nascitur in petrosis. *Cauliculi*, qui radiculis suis sese affigunt, & plures conjuncti nascuntur, foliolis vestiuntur brevibus, viridibus, densis; super hosce surrecti, tenuissimi, purpureo rubescentes, rigidiusculi emicant *cauliculi*, in vertice cuspidatis, ruffis *gemmaulis* instructi, cum cuspidate versus pedem cauliculorum inflexis, quæ siccae non nisi flavum continent pollinem. Unguis pollicis dextri pedis, hujus plantulæ *succo* illitus, cataractam sinistri oculi depellere creditur, & vice versa.

M O T T A . P U L L U .

T A B U L A X X X V I I I .



Umillima plantula nascens in arenosis. *Radices* tenues, albicantes, ac etiam rubescentes. *Caulis* tenues, rotundi, virides, gramineis angustis foliolis vestiti. Singulis caulibus, infra corticem, transversæ insident *spicæ*, numero tres vel quatuor, unico foliolo gramineo, brevi succinctæ, oblongæ, rotundæ, numerosis brevibus filamentis, penicilli instar, dotatae, ex parte spadiceo-fusco-rubrae, ex parte virides, maxime in vertice. Integra planta in aqua *Orizæ* & oleo *Marotti*, & virente *Curcuma*, vel etiam in oleo *Nucis Indicæ* & *Cumino Pipereque* longo decocta, linimentum præstat adversus morbum hepaticum, vitilagine & speciatim Alpheo comitatum.

A V E N K A .

T A B U L A X X X I X .



Plantula ad altitudinem cubiti nascens in arenosis. *Caulis* ex radice lignosa & fibrosa, plures exsurgunt simplices, tenues, lignosi, duri, rigidi, rotundioli, spadiceo nigricantes, glabri & nitentes. *Folia* in superiori parte caulium in duabus proveniunt seriebus, quorum petioli tenuissimi, surrecti, spadiceo nigricantes, nitentes; lata sunt, antè ora convexa, cauli obversa, tenuia, lenia, mollia, venis striata. Nullius vel saporis vel odoris. Nec floret nec fruet, neque ullius in medicina est usus.

Auenka. Lat.

അവുക്ക . malab.

Supuli

सुपुली . bramin.

سوفلي . Arab.



BELLAN-PATSJA.

TABULA XL.

Rutex est dilute viridis, hirta mollitie vestitus. *Cortex* subacutis, capillaribus & virididilutis foliolis, ramusculis adhærentibus, undiquaque cinctus; arenoso humidoque gaudet solo.



Poa plumosa
Eragrostis Buis.

Pars XII Tab. 41.


Tsjama-pullu. Lat.

കുളുല . Malab.

Tana.

तण्डुल . Sramin.

طهقنغ . Arab.



TSF A MA-PULLU.

TABULA XLI.

PLanta nascens in arenosis. *Radix* fibrosa, albicans. *Caules* rotundi, glabri, virides, geniculati, foliis gramineis vestiti. *Spicae* vertici caulium in petiolis viridibus insident, virides, complanatae, ex pluribus, minutis foliolis imbricatum conformatae; vetustiores fusce purpureae. *Semina* in illis continentur arenacea. Ignoti usus.



(prosci.)

Pars XII Tab 42.


Wara-pullu. Lat.

മലബാർ Malab.

Pena.

ദന്ത bramin.

وَعَرْعُ يُولُوحُو Arab.



W A R A-P U L L U.

TABULA XLII.



Uncus est in irriguo nascens solo. *Caules* glabri, triangulati, angulis parum obtusis, intus albicante, fistulosa medulla instructi. *Radix* albicans est, fibrosa, pedibus foliorum vestita, exterius ex rubro rufescens, carne aquea cum corculo albo. *Folia* oblongo-angusta, cuspidata, venis in longum striata. *Spicae*, in vertice caulium, foliis oblongis succinctæ prodeunt, in duabus seriebus distinctæ, petiolis transversim insidentes, oblongæ, planæ, compressæ, angustæ, viridi flavescentes. Intra singularum spicarum folia, imbricatim se mutuo obtegentia, *semina* continentur. *Succus* cum *Nuce Moschata* permixtus ventris dolores, Malabaricè *Rama Cua* & *Sura* dictos, mirum in modum sistit & emollit.



Kudira-pullu Lat.

കുടിറപ്പുലു Mal.

Tana.

तण्डुल Bamin.

فوطیر پول Arab.



KUDIRA-PULLU.

TABULA XLIII.



Lanta est quolibet gaudens solo. *Radix* convolvuli instar supra terram repit, fibris albicantibus, lignosis illi se affigens. *Caules* lignosi sunt, tortuosi, viridi flavescentes, nitentes, gemmulis quasi interstincti, in geniculis asperi, maxime cum versus inferiora stringuntur; superna parte, qua surrecti, virides & *foliis* vestiti; illa oblongo angusta sunt, in cuspidem desinentia, graminiformia, in oris, manibus adhærentia. In vertice caulium *spicæ*, filamentis tenuibus, rubescentibus, quaternæ simul proveniunt, cuspidatæ, rubescentes, inferius in exteriori parte a caule averſæ, *plumulas* duas emittentes argenteas, candicantes, & cum illis *apices* grandiusculos albicantes, qui in tenuissimis stamunculis penduli nutant. Extra usum in Medicina.




Paspalum scrobiculatum?

Pars XII Tab. 44.

Téréta-pullu. Lat.

മരമുള Malab.

طهره طی یولجا Arab.



TERETA-PULLU.

TABULA XLIV.

N Ascirur in arenosis, repens & terræ se affigens. *Caules* geniculati, rotundi, virides, glabri, *foliis* oblongis, angustis, cuspidatis, viridibus in geniculis vestiti. In vertice caulium spicati & geminati prodeunt petioli; *spicæ* in duabus seriebus sunt confitæ, rotundæ, parum cuspidatæ, duræ, albicantes. Nullius in medicina usus.



Festuca indica.

Pars XII Tab. 45.

Tsjama pullu Lat.

മടമുള Mal.

بنیامہ پونلخو Arab.



TSFA MAPULLU.

TABULA XLV.



PLanta arenoso gaudens solo. *Caules* rotundi, oblongi, tenues, intus tubulo pervii, glabri, virides, geniculati, in geniculis exuberantes, pedibus foliorum oblongis, angustis, gramineis vestiti, quæ inferiori pede articulos instar involucris includunt, rigida, proximè ad caulem pilis albicantibus in interiori latere barbata. In vertice caulium petioli breves, spicati prodeunt, foliosis involucris involuti. *Spicæ* ipsæ parvæ sunt, oblongæ, cuspidatæ, viridi dilutæ, quatuor constantes foliolis cuspidatis, in singulis *semen* includitur unicum. In vaccino *lacte* lævigata abscessus phlegmonodes desiccat: cum *Assa Fetida* & *Zingibere* in potiunculam præparata tormina ventris mitigat.



Saccharum spontaneum.

Pars XII. Tab. 46.

Kérpa. Lat.

കുടമാലാബ.

Bula

बाल ब्रामिन.

فريغ Arab.



K E R P A.

T A B U L A X L V I.



Ramannicè *Bala*, ad altitudinem duodecim pedum nascens in aquosis. *Radix* geniculata, primò rubescens, vetustior albescent, fibris capillatis, quas è geniculis emittit, se affigens. *Caules* rotundi, cavi, primùm viridescentes, adultiores & sicci albicantes, ligno duro, venis striato, calami instar, circa radicem caules emittentes laterales. *Folia* ex geniculis prodeunt, eosque convoluta includunt, ensiformia, stricta, crassiuscula, ima parte, qua à caule abcedunt, geniculo viridi diluto, albicantibus pilis vestito, interstincta, in interiori latere concava & albicante tunica obducta; in superiori caulium parte plumei conspiciuntur *glomi*, ex plurimis tenuissimis filamentis ceu petiolis compositi, qui argenteis, longiusculis ac glomulatis dispositis pilis sunt vestiti. *Semina* hisce filamentis insident condensa, parva, ruffo-rubra. *Cadi Pullu* similis est hæc planta, sed odoris expers, novis, oblongis, cuspidatis, albicantibus ac subflavescentibus oculis, qui ex radicis geniculis quasi extruduntur, se propagans. Ex *foliis* Apozema fit emmenagogum. Abscessibus imposita, illos ad maturitatem perducunt & aperiunt. *Radix* oleo incocta scabiem ac pruritus tollit.

Beli Caragà. Lat.


പലിക്കാട്. Malab.

Durba.

दुर्वा

bramin.


وہلی خوارقہ An.



B E L I - C A R A G A .

TABULA XLVII.


GRamen est, caulibus tenuibus, rotundis, glabris, viridibus, qui foliis vestiuntur oblongis & angustis. Plurimis cerimoniis in religione Bramannum celebratur hæc planta. Rheumata capitis & oculorum minuit linimentum ex hac planta, affuso *Nucis Indicæ* oleo & *Sandalo*, applicatum: Gingivarum dolores lenit, si nempe cum *Orizæ* decocto teratur.



Kaden-pullu. Lat.

കടൻപുളി Malab.

فخادون يولا Arab.



K A D E N - P U L L U .

T A B U L A X L V I I I .




Lanta quolibet gaudens solo. *Radix* nodosa, fibris plurimis capillatis, rubro nigricantibus, duris ac lignosis vestita. *Caules* omnes ex radice exsurgunt, virides, tenues, triangulati, oris acutis, intus parum lignosi, *foliis* oblongis, gramineis vestiti, illa in interiori parte profundo striantur sulco, in cuius tractu exterius *costula* extuberat. *Flores* in summitate caulium spicati proveniunt in petiolis tenuibus, planis, viridibus, qui supra foliorum exortum ex caule erumpunt, ramulis petioli transversis insidentes; *spicæ* sunt, quarum folia angusta & cuspidata. Illis deciduis in unoquoque calyce aperto unicum conspicitur semen rotundiolum ac trilaterale; primò viridi dilutum, deinde candidum & nitens; ad maturitatem ubi pervenerit albocinereum ad persicum vergens, forma gemmulam referens. Ex *radice* antinephriticum conficitur apozema.

Tagadi. Lat.

കോളി Malab.

طحاغي Arab.



T A G A D I.

T A B U L A X L I X.



Mnem amat fundum. *Caules* tenues, rotundi viridi albicantes, durioli, geniculati, viridibus foliorum involucris, vestiti. *Folia* arundinacea, oblongoangusta, pilis longis, albicantibus obsita, venis in longum striata, *costula*, in adversa parte eminente, instructa, interius sulco striata, viroris communis. *Flores* in summitate caulium proveniunt; *spicae* sunt oblongae, cuspidatae, mutuo se ipsas imbricatim obtegentes, viridialbicantes, nitentes, rigidae, circa cuspidem viridi fuscæ; quando se aperiunt, in medio lateris exterioris, ubi nonnihil convexæ, in longum hiant; inferius ex hiatu plumulam ceu *globulum* exserunt conicum, candidum; in cuius medio *stylus* oblongus, tenuis, candidus, pilis condensis in orbem circumdatus, conspicitur, & cum illo nonnulli apices oblongi albicantes. Nullos fert fructus & ignoti usus est.

Potta-pullu. Lat.

മുളു Malab.

Lauou.

तालवी Bramin.

يُطْعُ Arab.



P O T A - P U L L U.

T A B U L A L.



Uncus est aquaticus. *Radix* transversim prorepat geniculata, in geniculis late extuberans, alba, fibrosa, intus fungosa & aquea, exinde rufescens. *Caules*, qui ex radice exsurgunt triangulati ac glabri, uno latere nonnihil excavato, intus medulla candida, aquea, fungosa instructi, ad radicem foliosis involucris succincti, viroris communis, odorem Piperis spirantes. *Spicæ* in petiolis viridifuscis, planis, vertici caulium insident & plures congregatæ proveniunt, ad exortum petiolorum tribus, oblongis, graminiformibus foliis succinctæ, ruffæ. Inter scutellata foliola, candidissima *filamenta*, quorum *staminula* viridia & oblonga, emittentes. Cum hocce junco ædes obteguntur, incolas per biennium contra æris æstus, ventorumque injurias, fartos & integros servans. In medicina extra usum est.

Konda-pullu

കണ്ട പുല്ലു

Malab.


Tana.

तान

bramin.

قمارضيا يولا

Arab.




K O U D A - P U L L U.

TABULA LI.



Lanta quodlibet amans solum. *Radix* albicans, fibrosa. *Caules* rotundi, glabri, virides, geniculati, in geniculis cymis inflexi, *foliis* gramineis vestiti. *Spicæ* petiolis viridibus, surrectis, qui ex vertice caulium plures erumpunt, in duabus seriebus confertæ insident, fuscerubescences & nitentes, ex vertice *pilis* oblongis, surrectis, rubescentibus barbatae. Vires ignorantur.



Mottenga. Lat.

ବରକ ଶୁଣ୍ଠ


Mal.

موتنغا

Arab.

मुस्ता

bram.



MOTTENGA.

TABULA LII.



Uæ illius sunt species, *Mottenga* & *Pee-Mottenga*; prior Bramannibus dicitur *Musta*, herba submissa nascens in arenosis. *Radix* glandulosa, fusca, capillaceas & fuscas emittit fibras; ex quibus hinc inde novæ glandulosæ radices enascuntur, ex illis iterum fibræ & sic porro, aromatici & gratissimi odoris, maxime ubi siccæ, saporis subacris. *Caules* qui cum *foliis* ex radicibus proveniunt *triangulati* sunt, tenues, viridifusci, superius nodulo distincti, in nodulo *foliis* vestiti; illa graminea sunt, angusta, viridifusca, interiori parte striata, saporis subastringentis, sine odore. *Flores* in summitate caulium proveniunt, quorum petioli breves, & plures congregatim exeunt; *spicæ* sunt parvæ, tenues, planæ, ex rufforubescences; *filamenta* tenuia, breviora, flava ceu ruffa è medio ejicientes. Decoctum hujus plantæ sitim restringit. *Radices* Lusitanicè *Coquinba* dictæ in decocto usurpatæ, conducunt in febribus calidis & Diabete; *Oleum* ex radicibus extractum hepatis inservit, sitim restringit, ardorem febrium sistit, diabete curat, colicis illo inunctis, etiam crines auget. *Oleum* per destillationem ex radicibus extractum, crassum est & turbidum, cum tempore multas fæces ad fundum demittens, pinguis & unctuosæ consistentiæ, coloris viridi-flavo-fusci, odoris grati, saporis pinguis & subacris, in destillatione cum aqua simul adscendens eique innatans.

Pee Mottenga, Lat.

മലബാർ . *Malab.*

بجھ موطفيا . *Arab.*

मुसली . *bramin.*



P E E - M O T T E N G A .

T A B U L A L I I I .



Ecunda species, lingua Bramannum *Badera-Musta*, quasi diceret *Mottenga sylvestris*, cum priori specie in omnibus pene convenit; in eo tantum differens quod radices glandulosæ non sint, sed fibrosæ, ruffo nigricantes, tennes, in diversas conglomeratas fascias partitæ; ejusdem odoris, sed fortioris; propagatur per fasciarum avulsionem. Cum oleo decocta pruritus sedat facta corporis inunctione. Reliquæ virtutes cum illis primæ speciei conveniunt.




Mulin-pullu. Lat.

செஞ்செடியிலு

تولاهن يولاحه

Mul


Arab



M U L E N . P U L L U .

TABULA LIV.

GRamen est *caulibus* viridifuscis, planis foliis vestitis. *Spicæ* summitati caulium insident, in uno quasi capitulo congregatæ, ac foliis succinctæ, virides, ex plurimis constantes imbricatis foliolis. Jusculum ex hoc gramine præscriptum æstum corporis temperat.



Ira. Sat.

മലാബ. Malab.

عنب. Arab.

അ. bramin.



I R A.

T A B U L A L V.




Uæ hujus sunt species ejusdem nominis. Hæc Bramannicè dicitur *Rana Derpu*, planta est altitudinis duorum cubitorum. *Radix* nodosa est, quam plurimas confertas & arctè junctas subtus ejiciens fibras. E radice cum foliis gramineis *caules* exeunt rotundioli, triangulares, in summitate nodulo distincti, ex illo graminea *folia* sex, septem, plus minus in orbem transversim emittentes, inferiori parte à foliis arctè comprehensi, ac in plures fascias compositi: ipsa folia oblonga sunt, versus anteriora magis contracta, in latere superiori se nonnihil in medio claudentia, in adversa parte nervo eminente striata, oris acutis munita, coloris in utraque parte hyali & surdi. Ex caulis summitate à nodo supra folia graminea tres, quatuorve emicant petioli rigidi; illis *spicæ* densæ ac confertæ transversim, rectè, obliquè, omni ex parte insident, oblongo angustæ, compressæ, cuspidatæ, plano rotundiolæ, squammosæ, primùm ex albo viridi dilutæ, exinde rufescentes. *Semina* in illis minuta, angulata, spadiceofusca. *Folia* in decoctum præparata dolores ventris sedant, menstrua provocant.

Tra eu Basuri. Lat.

മല. *Malab.*

عربى. *Arab.*

ब्रह्म. *bramin.*



I R A ceu B A L A R I.

T A B U L A L V I.



Ecunda species, quæ à Bramannibus *Derpu* vocatur, cum prima in multis conveniens. Foliorum ora maximè acuta sunt & incidentia. *Caules* triangulati, sed acutioribus angulis, qui ex suo nodo petiolo spicatos non solum emittunt, sed & cum illis plures cauliculos, etiam ex suis nodulis spicatos proferentes petiolos, qui longiores sunt ut illi primæ speciei; *spicæ* in iis raræ & dissitæ, in duabus seriebus transversim sitæ, planiores, vel magis compressæ, ex flavoruffescentes. Vires conveniunt.




Kodi-pullu. Lat.

മകുടമുള Malab.

Dérbu.

दरभु bram.

قفا صغرى بولا Arab.




K O D I - P U L L U .

TABULA LVII.



Ramannes dicunt *Darpu*; nascitur in arenosis. *Radix* nodosa, duriola, fibris capillatis, rigidis vestita, albicans, oculis se propagans. *Caules* rotundi, geniculati, in superioribus internodiis ab una parte magis plani, & late sulcati, glabri, venis subtilissimis striati, primò viridi albicantes, vetustiores ex albicante flavescentes, nitentes, carne albicante, fungosa, sicca stipati, foliis oblongis, quæ geniculis sunt inserta, ac inter se mutuo convoluta, vestiti. *Folia* oblonga sunt & striata, quæ se cum cauliculis relaxant, & interiora versus claudunt; in adversa parte *costula* eminente & glabra obsita, interius in illius tractu lato sulco excavata, superficie glabra; oris acutis & incidentibus, viroris in recta parte communis, in adversa hyali, odoris aromatici. *Flores* spicatim ac condensi proveniunt, quorum petioli tenues, pandi, geniculati, ex geniculis novos etiam projicientes furculos floriferos, parti cavæ internodiorum accumbentes. *Spica* ipsæ primò virides sunt, oblongoangustæ, cuspidatæ in cuspidibus rigidiusculæ & nonnihil pungentes, ad pedunculos candidis capillis, cum quibus postea rufescunt, vestitæ, ex vertice unicum, tenue, longiusculum eicientes capillum; sed apertæ tenuissima ac albicantia *filamenta*; quorum *apices* oblongi, penduli, nutantes, subflavi, vetustiores crocei, lyra striati, demissi; præterea spica in uno pedunculo plures imbricatim sunt junctæ, folioso involucro primum obtectæ, sed tandem denudatæ; In singulis unicum continetur *semen* oblongoangustum, ex una parte cuspidatum, quod siccum rufescit. *Radix* in potiunculam præparata salivationem in febribus sistit.

Beera-kaidā. Lat.
വെറകൈദ. Mal.
بيرة خميرة. Arab.




BEERA-KUIDA.

TABULA LVIII.



Ascitur in arenosis. *Radix* fibrosa & ruffa. *Folia* ex radice exsurgunt, inferiori parte, circa radicem, se mutuo amplectentia, oblongoangusta, venis striata; *costa* in adversa parte eminet unica, in recta duæ. *Caules* tenues sunt, triangulati, interius à foliorum pedibus investiti, superiori parte geniculati, in geniculis foliis oblongis obfiti. *Flores* in capitulis proveniunt spicatis, quæ, cum suis petiolis, in cacumine caulium ex geniculis erumpunt; *Spicæ* sunt cuspidatæ, virides; in singulis unicum continetur *semen* rotundiolum, angulatum, spadicei coloris. Extra usum in Medicina.



Nila pāna kelangu. Lat.

നെലപാന കെളക്ക. Malal.

نیل پانا کلانگو. Arab.

मसळकोब bramin.



M E L L A - P A N A - K E L A N G U.

T A B U L V L I X.



Renosa amat. *Radix* fusca, subtus fibras crassiunculas albicantes emittens & obfuscatas, quæ vetustiores in annulos se corrugant. Caro albicans est & densa, non lignosa, nullius saporis, odoris haut injucundi, sed minus vegeti. *Folia* quæ duo, tria, plu-

rave è radice erumpunt, arundinacea sunt, venis in longum striata, tenuia, in medio longo eminente nervo obducta, reflexa, cum suo cuspide terram perforantia, ac novam radicem constituentia. Utrum floreat dubitatur. Decocta cum *Oleo Nucis Indicæ* & supino cervice epota, capitis dolores sedat, vertiginosos affectus & oculorum caligines abigit, visum acuit. Cum aqua decocta & epota antifebrile præstat medicamentum præsertim in colera; in pulverem redacta & ventri imposita stranguriæ medetur. *Radix* trita & assumpta idem efficit; in *lacte* dulci assumpta ardorem renum & ossium restringit.





Kalu-Tjo'sam Lat.

കുളംചട്ടി Malab.

Luvato.

കുഞ്ചക്കി bramin.

قحاطو شاليم Arab.



KATOV-STFOLAM.

TABULVLX.



Renoso gaudet solo. *Caules* rotundi, in *geniculis* foliis viridibus, oblongis, angustis, rigidis, anterieus cuspidatis, vestiti. Ex *geniculis* petioli prodeunt tenues, illi in calycibus foliosis *gemmas* concipiunt rotundas, nigricantes, vitreas. *Fructus* cum succo *Areka* levigatus, aphtas infantum sanat, si nempe lingua cum illo illinatur.




Kuren-pullu. Lat.

കുറേപ്പുല്ല . Malab.

Tana

तण . bramin.

تاجورين . Ar.




KUREN-PULLU.

TABULA LXI.



Uodlibet amat solum. *Caules* rotundi, oblongi, pilis capillati, *foliis* oblongis, angustis, cuspidatis, viridibus in geniculis vestiti. *Spicæ* conicæ sunt, virides, deinde rufescentes; in singulis unum continetur *semen* rotundum sed aliquo modo oblongum.

Extra usum in Medicina.




Sjerva kuren pullu. Lat.

മലർ കടൽ കടൽ കടൽ *Mal.*

Tana.

അന്ന *bramin.*
چیریا فخره جولا *Ar.*



T S F E R I A - K U R E N - P U L L U .

T A B U L A L X I I .

N Ascitur in petrosis. *Caules* rotundi, glabri, viridi diluti, geniculati, in geniculis qui extuberant ac rubescunt, cymis inflexi, & folioso involucro, quod pedem folii constituit, investiti. *Folia* oblongo-angusta in cuspidem desinunt, in oris pilis hirsutis obsita, manibus adhærentia, tenuia, lenia, venis subtilissimis in longum striata. In superiori caulium parte *pluma* geminata conspicitur, cujus *stamina*, rubropurpurea & tenuia, quæ ex spicis nigricantibus, oblongis, strictis, transversis prodeunt, atque ex illarum vertice emicant. *Spicæ* florentes flocculos emittunt albicantes. Ejus usus in Medicina ignotus.



Kol-pulli. Lat.
കളഹളി Malab.
قحان يوللحو Arab.




K O L - P U L L U

TABULA LXIII.



Uncus in arenoso & irriguo nascens solo. *Radix* ruffa, fibrosa. *Caules* triangulati, lateribus planis, glabri, virides, nonnihil nitentes, inferius *foliis* graminiformibus vestiti, medulla fungosa, albicante instructi. In illorum vertice oblongorotunda prodeunt spicæ capitula, foliis gramineis, ad exortum petiolorum succincta. *Spicæ* cuspidatæ sunt, virides & oblique surrectæ. De viribus nihil constat.



Tjeru-tjures Lac.

മലബാർ

Malab.

Vite.

वेति.

bramin.

جفرو چورل Arab.



T S F E R U - T S F U R E L.

T A B U L A L X I V.



Rutex nascens in petrosis, alio nomine *Rottang*. Rami arundinacei, cortice crassio-
lo, rigido, viridi, spiculis spinosis, rigidis,
oblongis, condensis, nigro rufescentibus
obducti. Folia illis *Ily* similia sunt, in in-
teriori parte, circa venarum tractum, pilis

hirsutis obsita. Flores simul cum fructibus, quorum
vertici insident, proveniunt racemati, parvi, rubro fufci,
tripetali, quorum petala rigida, versus fructum annulatim
inflexa. Fructus globosi, parum oblongi, superficie ad-
modum æquali & glabra; illorum cortex ex albo flavescit,
rigidiusculus est, interius albicans, exterius cancellis qua-
dratis ad normam linearum paralellarum nitidissime de-
pictus; ex hac pictura fructus aspectu jucundi sunt. Pulpa
viridis, succulenta, exigua, saporis acidi; in medio ossi-
culum continetur, in totum petrosus, una parte planum,
in meditullio umbilico lacunoso excavatum. In eduliis
sunt. Ex hac arundine, quæ in filamenta finditur, can-
cellatim contexta, indigenæ sedes conficiunt. Succus
radicis super craticulam torrefactæ, capiti illinitur adver-
sus Cephalæam.

*Calamus rotang
L. sp. 463.*

Natu-tsjures Lat.

കാട്ടിളിമല Malab.

Rana-vete

गान्दे bramin.

قحاطو جیورسل Arab.



K A T U - T S F U R E L.

TABULA LXV.

*Calamus rotundus, Willd.
Proc. Sp. 1. 383*

priori tantum differt, quod foliis sit majoribus ac etiam fructibus, qui maturi nigricant & comeduntur. *Nucleus* fructus siccat & pulverisatus genium ulcera sanat.




Perim-tsjuvel. Lat.

മലബ. ചുവർ Malab.

Todi-vele

वडिबेलि bramin.

پَرْمُوتْ جَوْزَلْ Arab.



PERI-M-TS FUREL.

TABULA LXVI.



Tertia species, cæteris major. Lusitani illam vocant *Rotas Grandes*; quæ ubi se arboribus affigit, ad altitudinem sex, septem, imo octo hominum exsurgit. *Arundines* rotundæ, duræ, virides, geniculatæ, in geniculis spinis densis, oblongis, aculeatis, duris, viridi flavescentibus, verticillatim cinctæ. *Folia* quæ geniculis supra spinas insident longa sunt, in cuspidem oblongum stricta, in oris spinis aculeata, in longitudine plicis striata, coloris viridi obscuri. *Flores & fructus* prioribus pene similes sunt, sed hi sunt majores, etiam in eduliis adhibentur. Medici virtutes ignorant.




Schoeranus paniculatus

Pars XII. Tab. 67.

Tsjolap-pullu. Lat.

മലഗുളി : Malab.

حبالا پو الحو. Arab.



TSFOLAP-PULLU.

TABULA LXVII.



Uncus qui in aquosis nascitur locis. *Radix* fibrosa, albicans. *Caules* triangulati, angulis acutis ac hærentibus; intus medulla albicante, fungosa, aquea; foliis gramineis, quæ in oris & costa media manui adhærent, vestiti. *Spicæ*, quæ à foliorum pedibus,

tanquam theciformi involucro substringuntur, parvæ sunt, oblongæ, angustæ, fusce rubescentes & nitentes; ubi florent singulæ tria transversum ejiciunt filamenta pilosa & candida. In unoquoque unicum continetur *semen*, instar gemmæ nigerrimæ ac nitentis cyatho oblongo, corallino insidens, ex quo cum *capitulo* emicat. Tota planta cum axunguia *Aprugna* in linimentum redacta contractos refocillat nervos. *Folia* cum aqua *Oryzæ* trita ossium dolorem leniunt. Succus in variolis, si nempe febris adsit, adhibetur.



Tjeru Cotsjilatti-pullu

செரிய சகர கிடுகிடுகி ஸ்

چھریا قحاجیہ پھلی پو لکھ




Eleusine
Cynorurus indicus
Pars XII. Tab. 69.

Cavara-pullu Lat.

കവരപ്പുല്ല Malab.

دقوعنق ولاحا



TSFERU-KOTSFILETTI-PULLU.

TABULA LXVIII.




Lanta est aquatica. *Radix* rotunda, oblonga, candida, viridibus, oblongis, densis vestita fibris, ex cujus summitate, inter *folia* graminea, exsurgunt *Caules* simplices, tenues, rotundi, virides, capitulo plano, rotundo, ruffo nodulati, inferius folioso, theciformi involucro, superius in orificio cuspidibus hiantes, ac venis in longum striato, involuti. Oleo *Nucis Indicæ* incocta scabiem & impetiginem sanat.




KAVARAPULLU.

Cynosurus indicus
L. sp. 186

TABULA LXIX.

 Ramen est *caule* oblongo, plano, gracili, foliis oblongis vestito, in summitate quatuor spicatis, transversis, decussatim (in formam crucis) dispositis, alato; quibus *spicæ*, in duabus seriebus, conferto ordine insident, illæ virides sunt, deinde rufescentes, complanatæ, ex pluribus constantes petalis inter se imbricatis, intra quæ *semina* continentur. De viribus nihil constat.



Cafri - Condā. Lat.

കാഴി-കണ്ടാ. malab.

Len-Camanī.

लंखमणी. bramin

لنخامني. Arab.



C A T R I - C O N D A.


T A B U L A L X X.



Aules hujus plantæ virides sunt, in internodiis geniculati, ab una parte plani. *Folia* quæ articulos pedibus suis investiunt, oblongo angusta, cuspidata, graminiformia, in recta parte ac in oris quam maxime adhærentia. *Fructus* caulibus insident rotundi, pa-

rum conici, ex quorum vertice petioli spicati, ex singulis unus emittuntur, ex basi emergentes cum duobus staminulis albicantibus, capitulis, veluti cornubus viridibus, ex vertice emicantibus, primo flavi, tum viridescentes & nitentes, postea albescentes, ex inde ex albo rubescentes & nigricantes, tandem ex albo cærulei, quorum bina filamenta oblonga sunt, tenuia, crispata, purpureorubro fusca. *Spicæ* oblongæ sunt & rotundæ, obtusi cuspidis, virides, se mutuo imbricatim obtegentes, bipetalæ; apertæ ac florentes, tenuissima candidaque eji-
ciunt filamenta, in vertice bifida, quorum apices, oblongi, grandiusculi, flavi, postea rufescentes, nutantes. Notandum quod ubi fructus adhucdum sint virides spicæ sese aperiant & florent; si flavi, petioli spicati nondum se exserant; si ex viridi albescant petiolis spicatis spolientur. Fructus, corallæ instar, in armillas nectuntur.

Tsjelli. Lat.
മലബ. Malab.
Tanapocala.
तणपोक. bamin.
جنتلی. Arab.



T S F E L I.

TABULA LXXI.



Ramannicè *Tanapocala*; planta est ex genere juncorum, nascens in aquosis & arenosis. *Radix* curta, numerosis fibris capillatis, nigricantibus vestita. *Caulis* qui simplices ex radice exsurgunt, juncei, larga cavitate, virides, geniculatis annulis interstincti, sed non in una parte, foliosis involucris vestiti, singuli fascia spicata, ruffa, ad geniculum inferiorem verticillatim maxima parte succincti. *Spicæ*, quæ ex foliis se invicem imbricatim contegentibus, viridibus, ac postea rufescentibus sunt compositæ, tria, cum florent, extra singula foliola, ejiciunt *filamenta* pendula, oblongis, nutantibus, flavescentibus dotata *apicibus*. *Semina* parva, triangularia, ficca, nigricantia nitentia, inter edulia sunt; ex illorum vertice unicum prorumpit filamentum; ubi maturi sunt *spicæ* filamentis suis privantur. Ex *Radice* cum *Mirabolanis* syrupus conficitur catharticus.

Scirpus articulatus
L. sp. 170

Ramacciam lat.

மர அ. Mal.

غُامَ حِيَامَ

बानको . bamin.



TABULA LXXII.



Ecunda species *Iribéli*, alba dicta; lingua Bramannum *Bocalo*, planta est quæ per totam invenitur Malabariam, in arenosis nempe & petrosis locis. *Radix* tortuosa, oculis se propagans, fibris implexis, densis, tenuibus, capillosis, quarum filamenta intus lignosa, coloris albi, nonnihil ad flavum vergentis, saporis amari, odoris, fragrantis sed minus vegeti. Illa quæ in Tutocorim invenitur; non est radicibus albis, sed ruffis, atque huic quam maximè præfertur, utpote vegetioris odoris. *Folia* ex radice prodeunt, oblongo angusta, gladiolorum instar, crassiola, plana, glabra, duriola, ab una parte in summitate se claudentia, venis subtilibus in longum striata, coloris viridis, cuspidibus minutis, incidentibus in oris minuta, interiori parte, versus quam clauduntur, viridi albicantia, ad radices, ubi fasciatim coadunata, albicantia, nullius saporis. Vetusior facta planta, ex radice unicus exsurgit *Caulis* planus, solidus, nodulatus, in nodulis pluribus foliis circumvestitus, in cujus summitate proveniunt *Flores* spicati, inter plumata quasi filamenta, quæ caulem in summitate investiant. Propagatur hæc planta radicum avulsione in terra arenosa, albicante, dissoluta. *Radix* in mercimoniis est, & magno studio ab incolis excolitur, minoris tamen pretii quam illa *Iribelli Nigræ*. Pro variis indispositionibus in infusionibus & decoctis adhibetur; Radicis autem decoctum, pro lotionem corporis usurpatus, quam maxime confert ad corroborandos artus, vitales etiam ac animales spiritus quam maxime fovens; hypochondriacis prodest ut & melancholicis, capitis dolors sedat. Apud indigenas principem obtinet locum pro febribus, ventris doloribus, capitis affectionibus, intestinorum torminibus & colicis passionibus, in decocto simpliciter vel cum aliis medicamentis propinata.


Nain Canna Lat.

നാലി കണ്ട Mal

Piscobo.

पेसकोब ब्रामि.

پسکوب



N A I N-C A N N A.

TABULA LXXIII.

EX genere *Cannarum* est, quas *Cannas sylvestres* vocant, nascens in arenosis. *Caules*, qui pedibus foliorum theciformiter convolutis investiuntur, rotundi sunt, viridi diluti, glabri, intus carne fungosa, alba, inter filamenta lignosa, striati, in medio fistulosa cavitate pervii, valde leves. *Folia* oblonga sunt, in cuspidem stricta, acutis oris, inflexura, qua à caulibus recedunt, interius geniculata, circa geniculum candida lanugine obducta. *Costa* media in adversa parte eminet, venis subtilibus in longum striata, intus tubulis pervia. In caulium vertice petioli prodeunt spicati, in interstinctis caulium intervallis, ubi rubescunt, idque plures congregati, in orbem dispositi ac oblique surrecti, ex nodulis rubescentibus, minores emittentes ramulos spicatos, plumæ instar diffusi, virididiluti, sed teneri rubescentes. *Spicæ* ipsæ ex spadiceo nigricant & nitent, in penicillis filamentorum argenteorum, per quæ transparent, consistæ. *Succus* per se sumptus, vel cum *Allio* tritus, palmisque cum manuum, tum pedum inunctus, spasmo medetur; cum *Zinzibere* lævigatus temporibusque illitus, maniacis hypochondriacisque confert. *Flores* cum canino stercore in lotura *Oryzæ* triti, idem præstant, temporibus applicati.

Tiri-panna Lat.

കിരീപന്നം. Malab.


طيرن عتھا. Arab.



T I R I - P A N N A.

TABULA LXXIV.

N Ascitur in petrosis. Radix fibrosa, lignosa. Folia sola ex radice exsurgunt, pedibus rigidis ac fuscis, oblongo angusta, in cuspidem stricta, crassiola, carnosae, plana, viridis fuscae, interius in medio striata, in oris rufiorubra, pulverulenta lanugine obducta. Floribus & fructibus destituitur. Succo ex foliis extracto aurium leniuntur dolores.



Spinifex squarrosus L.

Pars XII. Tab 75.

Ly multu. Lat.

ਅੰਬਰ. Mal.

جملی نولف. Arab.



I L Y . M U L L U .

T A B U L A L X X V .



Renosa amat. *Radices* albicantes, fibrosæ. *Caules* rotundi, duri, rigidi, geniculati, cymis tortuosè inflexi, novellos ex geniculis ejicientes caules, virides, cæruleo albicante rore adspersi. *Folia* pedibus caules circa geniculos amplectuntur, oblongo angusta, rigida, crassiola, interiori lato sinu sulcata, in cuspidem valde rigidum & aculeatum stricta, viridia, atque etiam cæruleo albicante rore suffusa, ubi siccescunt dilute rufescentia. *Capitula* caulibus insident rotunda, ex oblongis, viridibus, gramineis, in orbem diffusis cauliculis conformata, hi versus inferiora stringuntur, asperi sunt & manibus adhærent. In Capitulis, ad exortum cauliculorum, oblongæ, angustæ, cuspidatæ, virides emergunt *spicæ*, foliosis involucris comitatæ; ubi florent ac se aperiunt è vertice duo emittunt filamenta oblonga, albicantia, pilis albis barbata, ac cum illis minora quædam filamenta, ruffis apicibus dotata. In caulibus quibus hæc capitula adnascuntur, ad huc alii cauliculi spicati, & quidem plures congregati conspiciuntur, qui ex vertice emicant, spicis seriatim obsessi. *Spicæ* ipsæ virides sunt. *Radix* trita & cum cinere capilli humani decocta à maniacis cum succesu assumitur.

Tesutta-mudela-muceu. Lat.

മലബാർ
= *Malab.*
= *Arab.*
= *bramin.*



VELUTTA-MODELA-MUCCU.

TABULA LXXVI.




Uæ hujus sunt species, *Velutta-Modela-Muccu*, quasi diceret, *Modela-Muccu alba*, sic dicta a floribus albis, & *Schovanna-Modela-Muccu*. Prior Bramannibus dicitur *Davisiori-Touda*, planta est quæ nascitur in aquis, cum inferiori caulium parte super terram repens, ex geniculis radices, quibus se affigit, emittens. *Radices* fibrosæ, capillatæ, albicantes & fuscescentes, in fascias implexæ, saporis adstringentis & subamari, odoris expertes. *Caules* saporis sunt adstringentis, rotundi, glabri, virididiluti, geniculis ceu nodis laxis ac flexibilibus interstincti, in exortu articulorum extuberantes, è nodis hinc inde novos ejicientes caules, in ipsis nodis tenui, folioso, viridi albicante involucro amicti, illud pilosum est, extra nodos extensum, ex superiori parte longiuscula ejiciens filamenta, in exortu, paulo intra nodum, rubicundo circulo terminatum, dein fuscescens. *Folia* è geniculis proveniunt singula, oblongo angusta, in cuspidem contracta, saporis amari, sine odore. *Costa* media in utraque parte eminet, maximè in adversa. *Flores* in summitate caulium spicatim proveniunt in petiolis qui è nodis ex origine foliorum oriuntur; parvæ sunt *gemmæ*, pentapetalæ, oblongo rotundæ, albicantes; *stamina* in medio parva sunt, tenuia, albicantia, purpureorubris ac parvis dotata apicibus, sine odore. *Flores* primum aperti, postea se iterum claudunt ac viridescunt; constituentes gemmas oblongas, quæ seminum capsulæ sunt. In singulis unicum continetur *semen* rotundiolum, nonnihil planum, nigriferve flavi, deinde nitentis coloris, trigonum, glabrum, nigrum & nitens. Floret hæc planta toto anno. Contrita & in lacte acido data, intestinorum tormina lenit.

Schoranna-mudela-muccu Lat.

മലബാർ മരച്ചുരുക്കി Malab.

جيتوانضفا ما فحلا مضفون Arab.

അടി bramin.



SCHOVANNA-MODELA-MUCCU.

TABULA LXXVII.



Uasi diceret *Modela Muccu rubra*, altera species, lingua Bramannum *Tambiri-Siusori-Touda*, cum priori quam maxime convenit, sed hujus *caules* in totum rubescunt, intus corculo purpureo rubro instructi. *Folia* oblongoangustiora sunt. *Flores* nonnihil majores ac rosacei, ad petiolum rubicundiores, in summitate subalbicantes. Etiam *Gemmæ* majores sunt, in summitate rubroalbicantes, inferiora versus rubicundiores & nitentes. Et *semina*, sed illa ad spadiceum vergunt. Decocta cum *Oleo* linimentum præstat antiarthriticum. *Radix* cum aqua calida assumpta ventrem expurpat: *foliorum* decoctum in *lacte* acido datum, tumores ventris detumescere facit.




Tjetti-pullu lat
മലപ്പുളി malab.

Nazano.

नाकणो bamin.

جوتی Arab.



T S F T T I-P U L L U.

Cynasurus coracanus
L. Sp. 109

TABULA LXXVIII.



Lanta est ex genere frumentorum nascens in arenosis, & ad altitudinem quinque pedum assurgens. *Radix* nodus est brevis, plures capillatas, albicantes subtus dimittens fibras. *Caules* qui ex radice plures exsiliunt, rotundo plani sunt, albicantes, nitentes, venis striati, intus albo corculo, subulis subtilibus pervio, repleti, geniculis tuberosis interstincti, foliosis viridibus involucris vestiti, ex geniculis caules viridiores, planiores atque etiam geniculatos, suis quoque involucris obtekti, emittentes, qui caules seu culmi superius ad geniculos pluribus ac spicis sunt dotati capitulis. *Spicæ* in culmis densa serie ad unum latus confident primò virides, dein albicantes & nitentes, postea ex rubroruffescentes, vetustiores & siccæ ruffæ, valde planæ, quatuor vel quinque cuspidibus præditæ, intra suas vesiculas totidem includentes semina, nempe cum ad huc sunt immaturæ, sed maturæ semina rotunda sunt, & in totidem cuspidatas exturgescunt gemulas, cortice rubrofusco, quo inter pilandum depredatae, albescunt. Pista ex hac planta farina in pillulas formatur, quæ capiti adversus maniam imponuntur. Eadem farina cum *Ovi* albumine, vel *Nuce Indica* in scobem conquassata & commixta, distortisque manibus, pedibus aliisque partibus magno cum levamine circumlinitur; lumbis applicata robur genitale promovet. Prædictæ pillulæ in *Oleo Sergelim*, hoc est, *Tzit Elu* frixæ, panno insutæ ac dolenti parti impositæ, artuum dolores sedant; cataplasma ex hac farina confectum idem præstat; *semen* nodulo illigatum & in aqua coctum cum successu in cholera adhibetur.

Pennisetum spicatum.

Pars XII Tab. 79.

Tenna . Lat.

മരം . Malab.
Varai .

वरु . bramin.

طبق . Arab.



T E X X A.

TABULA LXXIX.




Tiam ex genere frumentorum nascens in arenosis. *Radix* ad instar est caulis nodosi, pluribus capillatis, rigidis, ex albicante subviridibus vestita fibris. *Caules* seu culmi, qui duo tresve numero, vel etiam simplices ex radice exsurgunt, rotundi sunt, ex viridi albicantes, nitentes, geniculati, ad geniculos foliosis angustis involucris, manu adhærentibus vestiti, in cacumine oblongum & spicatum gerentes capitulum, filamentis viridibus inter spicas eminentibus, barbatum. *Spicæ* ipsæ gemmulae sunt oblongo rotundæ, quæ filamentis viridibus, longiusculis, tanquam proprio conspiciuntur calyce. Maturescentes non tam longæ sunt, albicantes, subflaviusculæ, nitentes, in capitulo inter filamenta flavescentia gemmulas referentes. *Semina*, quæ in eduliis adhibentur, sunt gemmulae rotundæ, parum oblongæ, utrinque nonnihil cuspidatæ, albicantes, ad unam partem, ubi planiores sunt, hiulco cortice, sed illo inter pilandum detricto, magis albicant. Planta sola trita bubonibus venereis imponitur, cum aqua levigata & epota, sanguinem ex gravi casu aliave externa causa grumescentem rarefacit, dolorem colicum lenit, ventris torminibus, gonorrhææ, abscessibus illinendo medetur.

F I N I S.

I N D E X


Prior numerus Tabulam, posterior Paginam designat.

	A.			P.	
	nantali-Maravara.	7:	15	Panna-Kelengu-Maravara.	11: 23
	Angeli-Maravara.	1:	1	Panna-Mara-Maravara.	19: 39
	Arana-Panna.	31:	67	Panna-Valli.	35: 69
	Avenka.	39:	71	Para-Panna-Maravara.	15: 31
	B.			Patitsjivi-Maravara.	10: 21
	Basaala-Poulou-Maravara.	27:	53	Pee-Mottenga.	53: 99
	Beera-Cuida.	58:	109	Perim-Tsjurel.	66: 125
	Beli-Caraga.	47:	87	Ponnampou-Maravara.	3: 7
	Bellan-Patsja.	40:	73	Potta-Pullu.	50: 93
	Biti-Maram-Maravara.	2:	5	Puempeda.	36: 71
	C.			R.	
	Catri-Conda.	70:	133	Ramacciam.	72: 137
	E.			S.	
	Elettadi-Maravara.	20. 21:	41	Schovanna-Modela-Muccu.	77: 144
	I.			T.	
	Ili-Mullu.	75:	143	Tagadi.	49: 91
	Ira.	55:	103	Tama-Pouel-Paatsja-Maravara. Vel	
	Ira ceu Balara.	56:	105	Eneadi Kourengo.	14: 27
	K.			Tenna.	79: 151
	Kaden-Pullu.	48:	89	Tereta-Pullu.	44: 81
	Kal-Panna-Maravara.	16:	33	Thalia-Maravara.	4: 9
	Kansjiram Maravara.	8:	17	Theka-Maravara.	22: 43
	Kari-Welli-Panna-Maravara.	17:	35	Tiri-Panna.	74: 141
	Kathou-Theka-Maravara.	25:	49	Tsjan-Pullu.	41: 75
	Katou-Ponnam-Maravara.	28:	55	Tsjama-Pullu.	45: 83
	Katou-Kayda-Maravara.	26:	51	Tsjelli.	71: 135
	Katou-Tsjolam.	60:	113	Tsjeria-Kuren-Pullu.	62: 117
	Katu-Tsjurel.	65:	123	Tsjerou-Mau-Maravara.	5: 11
	Kavara-Pullu.	69:	131	Tsjerou-Tecka-Maravara.	23: 45
	Kerpa.	46:	84	Tsjeru-Valli-Panna vel Warapoli.	33: 65
	Kodi-Pullu.	57:	107	Tsjeru-Valli-Panna.	34: 67
	Kol-Pullu.	63:	119	Tsjeru-Tsjurel.	64: 121
	Kolli Tsjerou-Mau-Maravara.	6:	13	Tsjeru-Kotsjiletti-Pulli.	68: 129
	Kouda-Pullu.	51:	95	Tsjetti-Pullu.	77: 149
	Kudira-Pullu.	43:	97	Tsjola-Pullu.	67: 127
	Kuren-Pullu.	61:	115	Tsjudan-Tsjera.	36: 71
	M.			V.	
	Maravara-Tsjembo.	9:	19	Valli-Panna.	32: 63
	Maretta-Mala-Marava.	29:	57	Valli-Vara-Kody-Maravara.	30: 59
	Mella-Pana-Kelengu.	59:	111	Velutta-Modela-Muccu.	76: 145
	Motta-Pullu.	38:	71	W.	
	Mottenga.	52:	97	Wara-Pullu.	42: 77
	Mulen-Pullu.	54:	101	Wella-Theka-Maravara vel Mau-	
	N.			Maravara.	24: 47
	Nain-Canna.	73:	139	Welli-Panni-Kelengu-Maravara.	12. 13: 25
	Nella-Panna-Maravara.	18:	37		

INDEX GENERALIS

TOTIUS OPERIS.

Prior numerus Partem, alter Paginam dicit.

A.			B.		
	Cara-Patsjotti.	5. 15	B Adukka.	6. 110	
	Acatsja Valli, ceu		Bahel-Schulli.	2. 87	
	Mudila-Tali.	7. 83	Bahel-Tsjulli.	9. 171	
	Ada-Kodien.	9. 9	Bala, ceu Musa Serapionis.	1. 17	
	Adaca-Manjen.	10. 85	Balam-Pulli, seu Tamarindus.	1. 39	
	Adamaram.	4. 15	Balia-Mucca-Piri.	8. 21	
	Adamboe.	4. 45	Ballel.	11. 107	
	& 11. 115		Ban-Karetti.	6. 35	
	Adel Odagam.	9. 81	Bara-Mareca.	8. 85	
	Agati.	6. 73	Basaal.	5. 23	
Ain-Pariti.	1. 95		Basaala-Pou-Maravara.	7. 45	
Alpam.	6. 51		Basella.	7. 47	
Ambalam.	1. 91		Batta-Valli, vel Natsjam-Crua.	7. 1	
Ambapaja, ceu Paxaja.	1. 21		Batti-Schorigenam.	2. 75	
Ambel.	11. 51		Beénel.	5. 7	
Amelpodi.	5. 101		Beéra-Cuida.	12. 109	
Ameri, ceu Anil.	1. 101		Beésa.	5. 119	
Amolago.	7. 31		Beetla-Codi.	7. 29	
Ampana.	1. 13		Bel-Adamboe.	11. 119	
Amvetti, ceu Vetta Tali.	5. 107		Bel-Ericu.	2. 56	
Anantali-Maravara.	12. 15		Bela-Schota.	8. 9	
Ana-Coluppa.	10. 93		Bela-Pola.	11. 69	
Ana-Mullu.	8. 77		Belam-Canda-Schularmani.	11. 73	
Ana-Parva.	7. 83		Belilla.	2. 27	
Ana-Schorigenam.	2. 77		Beli-Tsjera.	9. 165	
Ana-Schovadi.	10. 13		Beli-Caraga.	12. 87	
Ana-Schunda.	2. 57		Bella-Modagam.	4. 121	
Anavinga.	10. 93		Bellan-Patsja.	12. 73	
Andi-Malleri.	10. 149		Bellutta-Tsjampkan, seu		
Angeli-Maravara.	12. 1		Castanea-Rosa-Indica.	3. 63	
Angolam.	4. 39		Bellutta-Amelpodi.	6. 83	
Anona-Maram, ceu Anon Oviedi.	3. 23		Beloere.	6. 77	
Ansjeti.	3. 25		Belutta-Tsjori-Valli.	7. 19	
Appel.	1. 47		Belutta-Areli.	9. 3	
Araka-Puda.	10. 39		Belutta-Kaka-Kodi.	9. 7	
Arana-Panna.	12. 67		Belutta-Onadu.	9. 99	
Arealu.	1. 27		Belutta-Itti-Kanni.	10. 7	
Arena-Ambel.	11. 52		Belutta-Modela-Muccu.	10. 159	
Aria-Bepou, ceu Nimbo a Costæ.	4. 107		Belutta-Adeka-Manjen.	10. 75	
Aria-Veela.	9. 41		Belutta-Pola-Tali.	11. 75	
Asjogam.	5. 117		Bem-Curini.	2. 33	
Ara-Maram.	3. 21		Bem-Schetti.	2. 19	
Atti-Alu.	1. 25		Bem-Nosi, vel		
Atti-Meer-Alou.	3. 75		Negunda foemina Acostæ.	2. 15	
Avankou, vel Ricinus.	2. 57		Bem-Pavel.	8. 35	
Avænka.	12. 71		Bem-Tamara.	11. 61	

INDEX GENERALIS.

Bengieiri.	4.	105
Ben-Kadali.	4.	89
Ben-Theka.	4.	63
Ben-Kalesjam.	4.	71
Ben-Kara.	5.	69
Ben-Moenja.	5.	113
Ben-Pala.	10.	115
Ben-Tiru-Tali.	11.	111
Bena-Patsja.	10.	95
Bilen-Schora.	8.	9
Bilimbi.	3.	55
Biti.	5.	115
Biti-Maram-Maravara.	12.	5
Blatti, seu Jambos-sylvestris.	3.	43
Bruxaneli.	5.	83
Brami.	10.	27
Bupariti.	1.	29
Bula.	10.	59

C.

Caca-Mullu.	10.	143
Caca-Palam.	8.	7
Cada-pilaua.	1.	97
Cadel-Avanacu.	2.	61
Cadelari.	10.	155
Cadenaco, seu Katu Kapel.	11.	83
Caicotten-Pala.	10.	65
Cajenneam.	10.	81
Caipa-Schora.	8.	9
Cammetti.	5.	89
Caniram.	1.	67
Canschena-pou.	1.	63
Canschi.	1.	76
Cansjen-Cora.	10.	103
Capo-Molaga, vel Capficum.	2.	109
Car-Elu.	9.	107
Cara-Nosi, vel		
Negunda mas Acoftæ.	2.	13
Cara-Schulli.	2.	91
Cara-Carinam.	9.	109
Cara-Veela.	9.	24
Carambu.	2.	95
Careloe-Vegon.	8.	49
Caretti, vel		
Lobus Echinoides Clusii.	2.	35
Cari Villandi.	7.	59
Carim-pana.	1.	11
Carim-Curini.	2.	31
Carim-Tumba.	10.	185
Carim Gola.	11.	91
Carua seu Canella Malabarica.	1.	107
Cat-Ambalam.	1.	93
Cata Valli vel Kadanaca.	11.	7
Catri-Conda.	12.	133
Cattu-Carambu.	2.	97
Cattu-Gasturi, vel Bammia.	2.	71

Cattu-Schiragam.	2.	37
Cattu-Molago.	7.	25
Cattu-Tirpali.	7.	27
Cattu-Picinna.	8.	14
Catu-Bara-Mareca.	8.	87
Catu-Paeru.	8.	97
Catu-Tsjandi.	8.	83
Cattu-Tirtava.	10.	171
Catulli Pola.	11.	79
Cattu Valli.	11.	127
Cavalam.	1.	89
Caunga seu Faufel.	1.	9
Champacam.	1.	31
Cheru-Chunda.	2.	67
Chunda.	2.	69
Chovanna-mandaru.	1.	57
Chovanna-mandaru, secunda		
species.	1.	59
Cit Ambel.	11.	53
Cit-Amerdu.	7.	39
Codaga-pala.	1.	85
Codagen.	10.	91
Codda-panna, seu Palma Monta-		
na Malabarica.	3.	1
Coddam-pulli seu Carcapuli Acoftæ.	1.	41
Codi-Avanacoe.	2.	34
Coletta-Veelæ.	9.	41
Colinil.	1.	103
Coluppa.	10.	21
Conna, seu Cassia Fistula.	1.	37
Corinti Panel.	5.	27
Corosinam.	9.	133
Cottam.	10.	153
Covalam, seu Cidonia Exotica		
Bauh. Pin.	3.	37
Covel.	8.	27
Courondi.	4.	103
Courou-Moelli.	5.	77
Cudu-pariti.	1.	55
Cupa-Vela.	9.	33
Cupameni.	10.	161
Cupi.	2.	37
Culi Tamara.	1.	193
Cumbulam.	8.	5
Cumbulu.	1.	75
Curigi-Tali.	7.	49
Curinil, vel Curignil.	7.	47
Curutu-pala.	1.	83

E.

ELa-Calli.	2.	83
Ela Pola.	11.	71
Elettadi-Marayara.	12.	41
Elettari.	11.	71
Elengi.	1.	33
Ene-pael.	9.	159
En-		

INDEX GENERALIS.

Entada.	9.	151	Kapa-mava, seu Acajous.	3.	65
Ericu, of Beid-el-Offar Alpini.	2.	53	Kappa-kelengu, vel Baratas.	7.	95
Erima-Taly.	7.	73	Kara-angolam.	4.	55
Erima-pavel,	8.	23	Kara-Tsjira.	10.	71
F.			Kare-kandel.	5.	25
Fula-mestica-Incarnata.	9.	1	Kareta-Tsjori-Valli.	7.	85
Fula-mestica-alba.	9.	3	Karetta Amelpodi.	5.	65
H.			Kari-bepou seu Nimbo altera.	4.	109
H Andir-alou.	3.	77	Kari-vetti.	4.	111
Hina-pareti.	6.	69	Kari-Welli-Panna-Maravara.	12.	35
Hummatu of Datura.	2.	47	Karii-kandel, seu Kanil-kandel.	6.	59
I.			Kariil.	4.	75
I Dou-moulli.	4.	41	Karin-Njori.	6.	31
Iripa.	4.	65	Karin Tagera.	6.	45
Ili Mullu.	12.	143	Karin-kara.	4.	49
Ilii, seu Bambu.	1.	25	Karin Pola.	11.	45
Inota-Inodien.	10.	139	Karinta-kali.	10.	41
Inschi vel Inschi Kua.	11.	23	Karivi-Valli.	8.	49
Intsia.	6.	7	Kasjavo Maram.	5.	37
Iribeli.	9.	145	Katapa.	5.	93
Ira.	12.	103	Katou-alou.	3.	37
Ira ceu Balara.	12.	105	Katou-Indel.	3.	15
Ifora-Murri.	6.	55	Katou-Tsjaca.	3.	29
Itti-alu.	1.	45	Katou-adamboe.	4.	47
Itti-Arealou.	3.	66	Katou-kadali.	4.	91
Itti-canni.	7.	55	Katou-kalesjam.	4.	69
K.			Katou-naregam.	4.	29
K Ada-kandel.	6.	67	Katou-Theka.	4.	59
Kadali.	4.	87	Katou-Tjeroe seu Cheru.	4.	19
Kadanacu vel Catavalla.	11.	7	Katou Bellutta Amelpodi.	5.	66
Kaden-kara.	5.	71	Katou-karua.	5.	105
Kaden-pullu.	12.	89	Katou-Mail-Elou.	5.	3
Kaida.	2.	1	Katou-patsjotti.	5.	13
Kaida Taddi.	2.	3	Katou-Conna.	6.	21
Kaida Tsjerria.	2.	7	Katou-Pul-Colli.	6.	41
Kaipa-Tsjira.	10.	47	Katou Inschi Kua.	11.	25
Kaka-Njara.	5.	55	Katou-Theka-Maravara.	12.	49
Kaka-toddali.	5.	81	Katou-Ponnam-Maravara.	12.	55
Kaka-mulla, vel Kaka-moullou.	6.	33	Katou Kayda Maravara.	12.	51
Kaka-kodi.	9.	11	Katou Tsjolam.	12.	113
Kaka-pu.	9.	103	Katsjau-panel.	5.	35
Kaku-Valli.	8.	63	Katsji-kelengu.	7.	71
Kal-Panna-Maravara.	12.	33	Katsjoula-kelengu.	11.	81
Kal-Vetadagou.	5.	61	Kattu-katsjil.	7.	69
Kal-todda-valli.	6.	15	Kattu-kelangu.	7.	71
Kalengi-kansjava.	10.	119	Kattu-Tagera.	9.	53
Kalesjam.	5.	67	Kattu-Tjetti-pu.	10.	89
Kaltsjerou-panel.	5.	33	Kattu-Tumba.	10.	183
Kalu-polapen.	9.	129	Kattu kelengu.	11.	105
Kalu Tali.	9.	157	Katu-beloeren.	6.	79
Kametti-Valli.	9.	23	Katu-mulla.	6.	99
Kandel.	6.	57	Katu Pissjegam Mulla.	6.	93
Kanneli-itti-kanni.	10.	9	Katu-kurka.	10.	179
Kansjiram Maravara.	12.	17	Katu-mailosina.	10.	131
Kapa Tsjaka.	11.	1	Katu-Tsjiregam-mulla.	6.	95
			Katu-		

INDEX GENERALIS

Katu-kara-Walli.	7.	33
Katu-Nuren-kelengu.	7.	63
Katu-Ulini.	8.	95
Katu-karavi.	9.	83
Katu-Pal-Valli.	9.	17
Katu-Pee-Tsjanga-puspam.	9.	113
Katu-Vistna-klandi.	9.	119
Katu-Uren.	10.	107
Katu Bala.	11.	85
Katu kapel seu Cadenaco.	11.	83
Katu Schena.	11.	41
Katu-Tsjurel.	12.	123
Kavara-pullu.	12.	131
Kedangu.	6.	49
Kerpa.	12.	84
Kilckola Tsjetti.	10.	113
Kirganeli.	10.	29
Koda-Tsjeri.	9.	131
Kondam-palu.	9.	57
Kodda pail.	11.	63
Kodi-pullu.	12.	107
Kol-pullu.	12.	119
Kolli-Tsjerou-mau-maravara.	12.	13
Konni.	8.	71
Kotsjiletti-pullu.	9.	139
Kouda-pullu.	12.	95
Kua.	11.	13
Kudda-mulla.	6.	89
Kudici-Valli.	8.	51
Kudira-pullu.	12.	97
Kuren-pullu.	12.	115
Kurka.	11.	49
Kurundoti.	10.	35

M.

M ail-anschi.	1.	73
Mail-Elou.	5.	1
Mail ombi.	5.	51
Mal-naregam, seu Malus limonia		
Pumula Sylvestris Zeylanica.	4.	27
Mala-Elengi.	5.	109
Mala poenna.	5.	17
Mala Inschi kua.	11.	29
Malacca, Schambu.	1.	27
Malacka Pela.	3.	33
Malam-Todda-Vaddi.	9.	37
Malan kua.	11.	17
Malla-katou-tsjambou.	4.	57
Mallam-toddali.	4.	83
Mallam-Tsjulli.	9.	163
Man-Onapu.	9.	95
Man-Todda-Valli.	9.	29
Manam-Podam.	10.	129
Mandari-Valli, vel Naga-Valli.	8.	55
Mandsjadi.	6.	25
Manga-Nari.	10.	11

Manja-kurini.	9.	121
Manja-Adeka-manjen.	10.	33
Manja kua.	11.	19
Manjapumeram.	1.	35
Manjella kua,	11.	21
Manneli.	9.	69
Manyl-kara.	4.	53
Mao seu mau vel mangas.	4.	1
Maravara-Tsjembo.	1.	19
Mareta Inali.	11.	129
Maretta-Mala-Marava.	12.	57
Marotti.	1.	65
Mella-Pana-Kelengu.	12.	111
Mendoni.	7.	107
Meriam-Pulli.	7.	91
Min-Angani.	9.	141
Modagam.	4.	119
Modeca.	8.	39
Modera-Canni.	2.	29
Modira-Valli.	7.	87
Modira-Caniram.	8.	47
Moetoe.	10.	139
Molago-Maram.	5.	49
Molago-Codi.	7.	23
Motta-Pullu.	12.	71
Mottenga.	12.	97
Moul-Elavou, seu Arbor lanigera		
Spinosa.	3.	61
Mouli-ila.	5.	67
Moullava.	6.	11
Mouricou.	6.	13
Mouringou.	6.	19
Mu-Kelengu.	8.	97
Mucca-Piri.	8.	25
Mudela-Nilu-Hummatu.	2.	51
Muel-Schevy.	10.	135
Mulen Schena.	1.	37
Mulen-Pullu.	12.	101
Mullen-Belleri.	8.	11
Mundi Valli.	11.	103
Muriguti.	10.	63

N.

N aga-Mu-Valli.	8.	57
Naga-Valli vel Mandaru-Valli.	8.	55
Naga-Dante.	10.	151
Naga-Pu.	10.	111
Nagam.	6.	37
Nai-Corana.	8.	61
Nain-Canna.	12.	139
Nala-Tirtava.	10.	169
Nalla-Mulla.	6.	87
Nalugu.	2.	43
Nandi Ervatam major.	2.	105
Nandi Ervatam minor.	2.	107
Nanschera Canschabu.	10.	99
Nans-		

INDEX GENERALIS.

Nansjera-Patsja.	9.	21	Nyrvala.	3.	43
Narinam-Poulli.	6.	75	O.		
Nari-Patsja.	10.	123	O Dallám.	1.	71
Naru-nundi.	10.	67	Oepata.	4.	95
Naru Kila.	11.	65	Onapu	9.	89
Narum-Panel vel Nimbo Acofta.	2.	2	Orela-modecca.	8.	45
Nati-fchambu.	1.	29	Ottel Ambel.	11.	59
Natsjam-Crua, vel Barra-Valli.	7.	1	P.		
Nehoemeca	8.	37	P Ada-Valli vel Pada Kelengu.	7.	93
Nedel-Ambel.	11.	57	Pada-Vara.	7.	71
Nedum-Schetti.	2.	21	Pada-Valam.	8.	29
Nela-Naregam.	10.	43	Padri.	6.	47
Nela-Tsjira.	10.	61	Paenoe.	4.	33
Nela-Vaga.	10.	137	Paeru.	8.	75
Nelam-Muri.	9.	161	Pai-paroea, feu Couradi.	5.	91
Nelam-pata.	10.	97	Paina-Schulli.	2.	93
Nelam-pullu.	10.	37	Pajanelli.	1.	79
Nelem-pala.	9.	5	Pala.	1.	11
Nelem-parenda.	9.	117	Palega-pajanelli.	1.	81
Nelen-Tsjunda.	10.	145	Pal Modeca.	11.	101
Nelenscheda major.	11.	39	Pal-Valli.	9.	19
minor.	11.	33	Panambu-valli.	7.	99
Neli-pouli, feu Bilimbi altera			Panavera Tjerava.	11.	56
minor.	5.	47	Pandi-Pavel.	8.	17
Neli-Pu.	9.	137	Pandi-Avanacu.	2.	60
Neli-Tali.	9.	31	Panel, vel Nimbo.	2.	9
Nella-Panna-Maravara.	12.	37	Panem-palka.	4.	9
Nellia-Tandali-Cotti.	9.	49	Panja, Panjala, feu atbor Lanigera		
Njara.	5.	53	Bontii.	3.	59
Niir-notsjil.	5.	97	Panitsjica-maram.	3.	45
Niir-Pongelion.	6.	53	Panna-Kelengu-maravara.	12.	23
Nila-Hummatu.	2.	49	Panna-mara-maravara.	12.	39
Nila-Barudena.	10.	147	Panna-Valli.	12.	69
Nili Cámaram.	1.	69	papajamaram.	1.	23
Njota-Njodem-Valli.	9.	27	Para-panna-maravara.	12.	31
Nir-murri.	9.	59	Parili.	5.	5
Nir-Pullari.	9.	67	Pariti feu Tali-pariti.	1.	53
Nir-Carambu.	2.	99	parpadagam.	10.	69
Nir-Schulli.	2.	89	parparam	9.	29
Nir-Cottam-Pala.	10.	101	Parua Kelenga.	11.	31
Nir-Pulla.	10.	53	Patitsjivi-maravara.	12.	21
Nir-Pulli.	10.	25	Patsjotti.	5.	9
Nir-Valli-Pulli.	10.	23	Pavel.	8.	19
Nir Tjembu.	11.	33	Pavetta, feu Malleamothé.	5.	19
Niruri.	2.	45	Pee-ponnagam.	5.	47
Nituri.	10.	53	Pee-Tsjerou-ponnagam.	5.	45
Niti-panna.	3.	7	Pee-Kandel.	6.	61
Niti-Todda-Vaddi.	9.	35	Pee-Ula.	7.	43
Niuren.	10.	109	Pee-Amerdu.	7.	37
Noel-valli, & Pannivalli.	6.	39	Pee-Tandale-Cotti.	9.	53
Noeli-tali.	4.	115	Pee-Tardavel.	9.	155
Nola-Ily.	5.	119	Pee-Tsjanga-pulpam.	9.	115
Nottenga.	9.	101	Pee-Tumba.	9.	87
Nurem-Kelengu.	7.	67	Pee-Cajenneam.	10.	83
Nyalel.	4.	37	Pee-Coipa.	10.	133
			R r		Pee:

INDEX GENERALIS.

Pee-Cupameni.	10. 163
Pee-Iniota-Iniodien.	10. 141
Pee-mottenga.	12. 99
Pela, seu Guayabo pomifera Indica B. Pin.	3. 31
Pelou, seu Guayabo Sylvestre.	3. 35
Penar-Valli. Fœmina.	8. 91
Penar-Valli. Masc.	8. 93
Peralu,	1. 49
Perim-munja.	9. 147
Perim-Tolassi.	10. 167
Perim-Tsjurel.	12. 125
Perin-Kaida-Taddi.	2. 5
Perin Teregam.	3. 81
Perin-kara.	4. 51
Perin-toddali seu Jujube Indica.	4. 85
Perin-njara.	5. 57
perin Nirouri, seu manirouri.	5. 85
Perin-Panel.	5. 29
Perin-patsjotti.	5. 11
Perin-Courigil.	6. 43
Perin Kaku-Valli.	8. 59
Petagu.	2. 41
Pevetri.	4. 113
Picinna.	8. 12
Piripu.	7. 101
Pitsjegam-mulla.	6. 91
Plafo.	6. 29
Podava-Kelengu.	7. 97
Poeatsjerri.	5. 103
Poerinsij.	4. 43
Pola-Tsjira.	9. 133
Ponga.	4. 73
pongam, seu minari.	6. 5
Pongati.	11. 47
Pongelion, five Perimaram.	6. 27
Pongolam.	7. 109
Ponna.	4. 79
Ponnagam.	5. 41
Ponnam-tagera.	2. 101
Ponnampou-maravara.	12. 7
Potta-pullu.	12. 93
Pou-Kandel.	6. 65
Poutaletsje.	4. 117
Pu-pal-valli.	7. 81
Pu-valli.	7. 79
Pu-tumba.	10. 125
Puam Curundala.	10. 127
Puempeda.	12. 71
Pul-Colli.	9. 135
Puli Schovadi.	11. 14
Putsja-paeru.	8. 77
R.	
R Amacciam.	12. 137
Rana-pumaram.	4. 125
Rava-pou.	4. 99

S.	
S Amstravadi, seu Caipa-tsambu.	4. 11
Samudra Sjogam.	11. 125
Schada-veli-kelengu.	10. 19
Schadida-Calli, vel Euphorbium.	2. 8
Schageri Cottam.	1. 105
Schakeri-Schora.	8. 3
Schanga-Cuspi.	8. 69
Schanganam-pullu.	10. 45
Schem-Pariti.	2. 25
Schembra-valli.	7. 11
Schena.	11. 37
Scheru-katu-valli, Caniram, vel Tsjeru-katu-valli-Kansjeram.	7. 9
Scheru-valli-Caniram, vel Sjerou-valli-Kansjeram.	7. 7
Scheru-pada-valli.	8. 31
Scheru-Bula.	10. 57
Scheru-Cadelari.	10. 157
Scherunam-Cottam.	2. 23
Schetti.	2. 17
Schetti-Codiveli.	10. 17
Schit-Elu.	9. 105
Schorigenam.	2. 39
Schovanna Adamboe.	11. 115
Schovanna Modela-Muccu.	12. 144
Schunambu-valli.	7. 21
Schunda-pana.	1. 15
Sendera Klandi.	11. 133
Sjasmin.	10. 1
Sida-pou.	6. 105
Sjouanna-Amelpodi.	6. 81
Sjovanna pola tali.	11. 77
Soladi-tirtava.	10. 173
Solda.	6. 103
Sondari.	5. 79
Soneri-Ila.	9. 127
Suendudi-pullu.	9. 75
Syalita.	3. 39
T.	
T Agadi.	12. 91
Tagera.	2. 103
Tala Neli.	11. 113
Tali-pullu.	9. 123
Taliir Kara.	5. 75
Talu-Dama.	7. 105
Tama-pouel-paatja-Maravara, vel Eneadi Kourengo.	12. 27
Tamara.	11. 59
Tamara-tonga, seu Carambolis.	3. 51
Tandale-Cotti.	9. 45
Tandale-Cotti.	9. 47
Tani.	4. 23
Tardavel.	9. 149
Tenga, seu palma Coccifera.	1. 1
Penna.	

INDEX GENERALIS.

Tenna.	12.	157
Teregam.	3.	79
Tereta-pullu.	12.	81
Thalia-Maravara.	12.	9
Theka.	4.	57
Theka-Maravara.	12.	43
Thora-paërou.	6.	23
Tjageri-Nurem.	7.	63
Tjem Cumulu.	11.	97
Tjeru-Kirganeli.	10.	31
Tilo-Onapu.	9.	101
Tinda-parua.	1.	87
Tjori-valli.	7.	17
Tiri-Itti-Canni.	7.	57
Tiri-panna.	12.	141
Tiru-Calli.	2.	85
Tiru tali.	11.	109
Todda-panna.	3.	9
Todda-vaddi.	9.	33
Tondi-teregam.	4.	123
Tota-piri.	8.	33
Tseria-Samstravadi.	4.	15
Tsja-pangam.	6.	3
Tsjadaen.	10.	175
Tsjahela.	3.	87
Tsjaka-maram, seu Jaca.	3.	17
Tsjama-pullu.	12.	83
Tsjan-pullu.	12.	75
Tsjana Kua.	11.	15
Tsjanga-pulpam.	9.	111
Tsjangelam-parenda.	7.	77
Tsjela.	3.	35
Tsjelli.	12.	135
Tsjem-tani.	4.	25
Tsjera-pu-pal-valli.	7.	103
Tsjera-Canetti valli.	8.	89
Tsjera-Uren.	9.	143
Tejere-Maram.	6.	109
Tsjerou-Caniram, vel Tsjerou- Cansjeram.	7.	3
Tsjeria Nirouri, seu Katou Nirouri.	5.	87
Tsjeria-Manga-Nari.	9.	167
Tsjeria-Narinam-pulli.	9.	169
Tsjeria-Onapu.	9.	93
Tsjeria-Belutta-Adeka-Manjen.	10.	77
Tsjeria-Kuren-pullu.	12.	117
Tsjeriam-Cottam.	5.	21
Tsjerii-Mulla.	6.	85
Tsjeroea Cit Ambel.	11.	57
Tsjerou-meer-alou.	3.	71
Tsjerou-kadali.	4.	93
Tsjerou-katou-naregam.	4.	31
Tsjerou-ponna.	4.	81
Tsjerou-theka.	4.	61
Tsjerou Kanneli.	5.	99

Tsjerou Kara.	5.	73
Tsjerou panel.	5.	31
Tsjerou poëam.	5.	111
Tsjerou-ponnagam.	5.	43
Tsjerou-Kandel.	6.	63
Tsjerou-Mau-Maravara.	12.	11
Tsjerou-Tecka-Maravara.	12.	45
Tsjeru-Manneli.	9.	73
Tsjeru-Vela.	9.	63
Tsjeru-Urem.	9.	243
Tsjeru-Cansjava.	10.	111
Tsjeru-Jonganam-Pullu.	10.	51
Tsjeru-Parua.	10.	105
Tsjeru-Talu-Dama.	10.	49
Tsjeru-Tardavel.	10.	187
Tsjeru-Vallel.	10.	55
Tsjeru pu.	10.	87
Tsjeru-Valli-panna vel Warapoli.	12.	65
Tsjeru-Valli-panna.	12.	67
Tsjeru-Tsjurel.	12.	123
Tsjeru-Kotsjiletti-pullu.	12.	129
Tsjetti-Mandarum.	6.	1
Tsjetti-pulli.	12.	149
Tsjiregam-Mulla.	6.	97
Tsjocatti.	5.	95
Tsjola-pullu.	12.	127
Tsjovanna-Aleti.	9.	1
Tsjovanni-Manneli.	9.	71
Tsjudan-Tsjera.	12.	71
Tsjude-Maram.	6.	107
Tsjuria Cranti.	11.	123
Tumba.	10.	181
Tumba-Codiveli.	10.	15
V.		
VA Embu.	11.	99
Vada-Kodi.	9.	74
Valli Schorigenam.	2.	79
Valli-Teregam.	3.	83
Valli Caniram.	7.	5
Valli-Kara.	7.	35
Valli-Modagam.	7.	89
Valli-Onapu.	9.	91
Valli-Upu-Dali.	9.	85
Valli-Itti-Canni.	10.	5
Valli-panna.	12.	63
Valli-Vara-Kody-Maravara.	12.	59
Vallia-pira-pitica.	7.	13
Vallia-Tsjori-Valli.	7.	15
Vallia-Capo-Molago.	9.	65
Vallia-Manga-Nari.	10.	79
Veetla-Caitu.	7.	109
Velutta-Mandura.	1.	61
Velutta-Modela-Muccu.	12.	145
Veradagou.	5.	59
Vidi-maram.	4.	77
Vistnu		

INDEX GENERALIS.

Vistnu Clandi.	11. 131	Watta-tali.	5. 63
Ula.	7. 41	Watta-Kaka-Codi.	9. 25
Ulina.	8. 53	Wattou-Vali.	7. 61
Unjala.	7. 53	Weli Ila.	11. 43
Upu-Dali.	9. 125	Welia-Cupameni.	10. 165
Uren.	10. 3	Wella-Theka-Maravara vel Mau-	
		Maravara	12. 47
W Adapu.	10. 71	Welli-panni-Kelengu-Maravara.	12. 35
Wadouka.	4. 97	Wella Tagera.	6. 17
Waga.	6. 9	Wella-Tandali-Kotti.	9. 51
Wallia-pal-Valli.	9. 15	Welli Codiveli.	10. 117
Wara-pullu.	12. 77		